

NOTA BREVE / SHORT NOTE

Primera cita de *Euchloe ausonia* (Hübner, [1804]) para la provincia de Ourense (Galicia, España, N.O. Península Ibérica).
(Lepidoptera: Pieridae).

Eliseo H. Fernández Vidal

Plaza de Zalaeta, 2, 5ºA. E-15002 A Coruña (ESPAÑA). e-mail: lisuco1@hotmail.com

Palabras clave: Lepidoptera, Pieridae, *Euchloe ausonia*, primera cita, Ourense, Galicia, España, N.O. Península Ibérica.

First record of *Euchloe ausonia* (Hübner, [1804]) from the province of Ourense (Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula). (Lepidoptera: Pieridae).

Key words: Lepidoptera, Pieridae, *Euchloe ausonia*, Ourense, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula, first record.

Recibido: 28 de septiembre de 2017

Publicado on-line: 28 de octubre de 2017

Aceptado: 8 de octubre de 2017

En Fernández Vidal (2017) reseñamos que, por lo que respecta a territorio gallego, el piérido *Euchloe ausonia* (Hübner, [1804]) era exclusivo de O Courel, bien entendido que los adyacentes Montes de Loúzara, de donde se ha citado también esta especie (Pino Pérez *et al.*, 2008), pudieran considerarse sin mayor objeción constituyentes de dicha comarca. También estimábamos literalmente (p. 85) que: "Seguramente la ausencia de substrato calizo sea la razón de que no se haya detectado en los Ancares (Lugo) ni en el área de Trevinca (Ourense) y la excesiva termofilia que tampoco aparezca en la caliza Serra da Enciña da Lastra (Ourense)".

Elaborando el referido trabajo de nuestra autoría, creímos haber examinado todo nuestro material del complejo *ausonia-crameri* de otras partes de Galicia, incluyendo el del resto de sierras orientales (Ancares, Trevinca, Macizo Central Orensano y Serra da Enciña da Lastra), que se refería a *Euchloe crameri* Butler, 1869. La revisión minuciosa de material adicional nos ha permitido localizar varios ejemplares inequívocamente adscribibles a *E. ausonia* procedentes de una localización de la última sierra anotada y que significan los primeros registros de esta especie para la provincia de Ourense.

Material estudiado:

Biobra, Rubiá (Ourense), 680 m, 29TPH70: 3♂♂, 26-V-2003; 1♂, 9-IV-2004; y 1♂, 24-IV-2004.
Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño *leg.*

Constituye la localidad a menor altitud en la que hemos recolectado la especie en Galicia y en donde es simpátrica y sincrónica con su congénérica *E. crameri*, mucho más abundante, aunque estimemos que estos ejemplares sean divagantes procedentes de mayores alturas en esta área, probablemente de la línea de cumbres que culminan en los 914 m del monte Morango. Queda claro que la termofilia en la Serra da Enciña da Lastra no es factor limitante para su presencia.

Bibliografía

Fernández Vidal, E.H. 2017. Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) XII: Papilionidae, Pieridae y nota adicional sobre Hesperiiidae y Lycaenidae. (Insecta: Lepidoptera). *Archivos Entomológicos*, 18: 79-96.



Pino Pérez, J.J.; Camaño Portela, J.L.; Silva-Pando, F.J. & Pino Pérez, R. 2008. Aportaciones corológicas para *Rhopalocera* (Lepidoptera) del N de España. *Boletín BIGA*, **4**: 59-86.