

NOTA BREVE / SHORT NOTE

Notas sobre coleópteros gallegos. VI. Algunas precisiones sobre las localidades típicas de *Tasgius hispanicus* Schillhammer, 2009 (Coleoptera: Staphylinidae).

Javier Pérez Valcárcel

e-mail: jpvalcarcel@aegaweb.com

Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, *Tasgius hispanicus*, Galicia, N.O. Península Ibérica, faunística.

Abstract: Notes on Galician beetles. VI. Some precisions about the typical localities of *Tasgius hispanicus* Schillhammer, 2009 (Coleoptera: Staphylinidae).

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, *Tasgius hispanicus*, Galicia, NW Iberian Peninsula, faunistics.

Recibido: 7 de septiembre de 2017

Publicado on-line: 9 de octubre de 2017

Aceptado: 17 de septiembre de 2017

El estafilínido *Tasgius hispanicus* Schillhammer, 2009 (Coleoptera, Staphylinidae) fue descrito por SCHILLHAMMER (2009), a partir de tres ejemplares (2♂♂ y 1♀) de tres localidades del este de la provincia de Lugo (Galicia, N.O. de la Península Ibérica) (véase tabla), sin que hayan sido publicadas citas posteriores de esta especie, hasta donde se ha podido comprobar. Dichos ejemplares fueron capturados por el autor de esta nota en el transcurso de una serie de muestreos realizados entre los años 2000 y 2005 en la provincia de Lugo, enviados (junto con el restante material de estafilínidos capturado) a Michael Schülke (Berlín) y posteriormente reenviados por éste a Harald Schillhammer (M. Schülke, com. pers.), quien fue el que finalmente describió la especie que nos ocupa.

Por diversas razones que no se considera necesario detallar, el autor de esta nota no tuvo conocimiento de dicha publicación hasta años más tarde. En la lectura de la misma se pudieron constatar algunos errores en la denominación de las localidades típicas, probablemente debidos a la incorrecta interpretación de etiquetas rotuladas a mano. El propósito de esta nota es subsanar los mismos, así como aprovechar la ocasión para aportar nuevos datos sobre hábitats y circunstancias de captura que permitan ampliar los escasos datos sobre la biología de esta especie de distribución, al menos aparentemente, tan restringida.

Comentarios

Schillhammer (2009)	Denominación correcta
Holotipo ♂: "Lugo, O Rial, 450 m, Serra do Mirador, 29TPH4284"	Lugo, O Rial, 450 m, Serra do Miradoiro, UTM 29TPH47
Paratipo ♂: "Lugo, Ferreira de Incio"	Lugo, Ferrería de Incio, 750 m, Serra do Ouribio, UTM 29TPH32
Paratipo ♀: "Lugo, Vallonga, 550 m"	Lugo, Valonga, 550 m, UTM 29TPH37

En O Rial, localidad típica en la parte baja de la Fraga da Marronda (Fig. 1), la captura fue realizada por cribado de hojarasca. Tanto en Ferrería de Incio como en Valonga, mediante trampas de caída tipo *pitfall* cebadas con vinagre, respectivamente en un soto de castaños y en un bosque caducifolio mixto. *Tasgius hispanicus*, por tanto, parece ser una especie edáfica ligada a bosques caducifolios relativamente bien conservados, de no gran extensión, y situados a baja y media altitud. Dada la abundancia de este tipo de masas forestales en el interior de la provincia de Lugo, y en general en el interior de Galicia, es probable que sea una especie de distribución más amplia de lo que las capturas iniciales dan a entender.

Agradecimientos

A M. Schülke (Berlín), por facilitarme la noticia de la publicación y el artículo donde se describe la especie que nos ocupa. A Raimundo Outerelo (Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid) por la lectura del manuscrito y sus comentarios.

Bibliografía

SCHILLHAMMER, H. 2009. Notes on some West Palearctic Staphylinini, with description of a new species from Spain. *Koleopterologische Rundschau*, **79**: 97-116.




Fig. 1. - Fraga da Marronda en O Rial, localidad típica de *Tasgius hispanicus* Schillhammer, 2009.