

Aportaciones al inventario de los Heteroptera (Hemiptera) de Galicia (N.O. Península Ibérica). V. Pentatomoidea

Javier Pérez Valcárcel¹ & Fernando Prieto Piloña²

¹ A Coruña. e-mail: arquivosentomologicos@gmail.com

² Sanxenxo (Pontevedra). e-mail: fprieto@aegaweb.com

Resumen: Se recopilan datos faunísticos de 75 especies válidas de Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) pertenecientes a las familias Cydnidae Billberg, 1820, Pentatomidae Leach, 1815 (excepto Asopinae), Scutelleridae Leach, 1815 y Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843 presentes en Galicia (N.O. Península Ibérica). De ellas, 19 especies se citan por primera vez de Galicia. Cabe destacar la presencia de *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794), *Holcostethus (Holcostethus) albipes* (Fabricius, 1781), *Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851, *Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis* Wollaston, 1858, *Psacasta granulata* (A. Costa, 1847) y *Odontoscelis hispanica* Göllner-Scheiding, 1987, por estar escasamente citadas en la Península Ibérica o por ampliar de forma notable su área de distribución conocida.

Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Cydnidae, Pentatomidae, Scutelleridae, Thyreocoridae, faunística, Galicia, Península Ibérica.

Abstract: Contributions to the inventory of the Heteroptera (Hemiptera) of Galicia (N.W. Iberian Peninsula). V. Pentatomoidea. Faunistic data of 75 valid species of Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) belonging to the families Cydnidae Billberg, 1820, Pentatomidae Leach, 1815 (except Asopinae), Scutelleridae Leach, 1815 and Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843 from Galicia (NW Iberian Peninsula) are compiled. Of them, 19 species are recorded from Galicia for the first time. It is worth noting the presence of *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794), *Holcostethus (Holcostethus) albipes* (Fabricius, 1781), *Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851, *Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis* Wollaston, 1858, *Psacasta granulata* (A. Costa, 1847) and *Odontoscelis hispanica* Göllner-Scheiding, 1987 for being scarcely recorded in the Iberian Peninsula or for expanding significantly their known distribution range.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Cydnidae, Pentatomidae, Scutelleridae, Thyreocoridae, faunistics, Galicia, Iberian Peninsula.

Recibido: 27 de abril de 2026

Aceptado: 15 de mayo de 2026

Publicado on-line: 13 de junio de 2026

Introducción

Con este trabajo se completa el estudio faunístico sobre la presencia en Galicia de la superfamilia Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) iniciado en Valcárcel & Prieto (2014) con el estudio de los Acanthosomatidae y Asopinae (Pentatomidae). No ha sido posible hasta la fecha aportar registro alguno en el área de estudio de la familia Plataspidae, presente en la Península Ibérica con una sola especie y aparentemente ausente en Galicia. Como ya se ha mencionado repetidamente en entregas anteriores de esta serie (véase, entre otras, Valcárcel & Prieto, 2009), el conocimiento sobre la distribución de los Heteroptera en la Galicia es escaso, con citas en general aisladas y repartidas en trabajos de procedencia diversa. Para las familias que se tratan en el presente artículo esta afirmación es extensible, con pocas excepciones, a la mayoría de la Península Ibérica, probablemente (y casi con seguridad) por el insuficiente esfuerzo de muestreo y la escasez de especialistas interesados en este grupo. Aun así, el conocimiento sobre estas familias es bastante dispar, destacando la poca atención que han recibido, por ejemplo, la familia Cydnidae o ciertos géneros especialmente complejos de Scutelleridae, en comparación con la familia Pentatomidae.

Los datos previos que se han podido localizar en la literatura disponible proceden de aproximadamente unos cuarenta trabajos, cuya aportación de datos resulta bastante desigual. Sin necesidad de enumerarlos todos aquí, la mitad de ellos apenas aportan uno o dos registros, mientras que del resto pueden destacar por ofrecer cierto volumen de datos dos trabajos recientes, como son el de Goula & Valcárcel (2016), con registros urbanos de A Coruña, y el de Roca-Cusachs & Goula (2017a), basado en registros fotográficos provinciales inconcretos. De entre los demás, podemos mencionar algunos trabajos clásicos como los de Bolívar & Chicote (1879) o Chapman & Champion (1907), las citas inconcretas para la provincia de Pontevedra de Español (1956), los escasos registros procedentes de los trabajos de revisión de Fuente (1972a, 1972b, 1973, 1974, 1975) o el de Vázquez *et al.* (2003), de un ámbito geográfico tan limitado como el de las islas Cíes.

Por diversas circunstancias esta parte de nuestro estudio en curso se ha retrasado con respecto a su fecha prevista de publicación, anterior a otros trabajos iniciados de forma simultánea pero ya publicados, por lo cual su numeración dentro de la serie es anterior. Uno de los factores que más ha pesado en la decisión de aplazar la publicación ha sido el retraso en la aparición de los nuevos volúmenes de la *Faune de France* de los grupos restantes de Pentatomoidea, anunciados por la *Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles* hace ya unos años. Pasado un tiempo considerado más que prudencial, y a la vista de que dicha publicación sigue sin llevarse a cabo, se ha decidido no esperar más y sacar a la luz este trabajo. Por tanto, la determinación y la nomenclatura de las especies tratadas se ha realizado según el estado de conocimiento actual, siendo conscientes de que en un futuro próximo la publicación de dichas obras puede modificar de forma significativa la taxonomía y los conocimientos sobre distribución de algunas especies. La parte positiva es que dicho retraso ha permitido incorporar nuevos datos que han enriquecido el trabajo.

Material y métodos

Para el presente trabajo se ha utilizado la misma metodología que para anteriores entregas de esta serie (véanse, entre otros, Valcárcel & Prieto, 2009, 2012). Los datos inéditos de los ejemplares citados proceden de capturas y observaciones a partir de muestreos no sistemáticos efectuados entre 1982 y comienzos de 2026 en 203 localidades de la comunidad autónoma de Galicia. Hay que señalar que una parte de los datos corresponden a observaciones de ejemplares identificados en el campo y no capturados de especies comunes, cuya determinación *de visu* es sencilla e inequívoca.

Para la determinación se ha seguido a Derjanschi & Péricart (2005), Péricart (2010), Ribes & Pagola-Carte (2013) y Lupoli & Dusoulier (2015), así como diversos trabajos para algunos géneros concretos (véanse referencias más adelante en el texto).

Para la ordenación y nomenclatura de las especies se ha seguido a Roca-Cusachs *et al.* (2018b), con las excepciones que se especifican posteriormente. Para cada especie se han aportado todas las citas previas gallegas en la bibliografía disponible hasta donde se ha podido revisar, las citas inéditas y una breve reseña genérica sobre su distribución mundial y peninsular, así como un comentario cuando se ha considerado procedente. En el apartado de citas gallegas previas se omiten citas imprecisas regionales cuando existen citas posteriores con localidades concretas.

El objetivo principal de este trabajo es el de reunir todos los datos previos e inéditos disponibles por lo que para los comentarios sobre la distribución peninsular se ha evitado intencionadamente ser exhaustivos con la bibliografía previa, citándose sólo aquellas referencias que se han considerado más representativas. Tampoco se ha podido evitar que a menudo los comentarios sean repetitivos, debido a que la mayoría de especies tratadas en este artículo presentan una amplia distribución peninsular, aunque con citas dispersas y numerosas lagunas, reflejando más las diferencias en el esfuerzo de muestreo que su verdadera distribución, la cual en muchos casos está por definir de forma precisa.

Los legatarios más habituales del material estudiado se indican en el texto mediante las siguientes abreviaturas: Pedro Álvarez (PAL), Eliseo H. Fernández Vidal (EFV), Lorenzo Gómez Prieto

(LGP), Alejandro Ocampo (AO); Antonia Rodríguez Fandiño (ARF), Javier Pérez Valcárcel (JPV), Juan Pérez Arias (JPA) y Fernando Prieto Piloña (FPP). Todos los ejemplares capturados se hallan depositados en la colección de Javier Pérez Valcárcel, salvo indicación en contra. Así, algunos ejemplares fueron donados posteriormente a su estudio a la colección del Museo de Historia Natural de la Universidade de Santiago de Compostela (MHNUSC).

La lista actualizada de las especies localizadas hasta ahora en Galicia y su distribución por provincias se encuentra en el Anexo 1. En el Anexo 2 se indican las coordenadas UTM 10x10 km para cada una de las localidades de las que se ha podido estudiar material inédito.

Lista de especies

Superfamilia PENTATOMOIDEA Leach, 1815

Familia CYDNIDAE Billberg, 1820

Subfamilia Cydninae Billberg, 1820

Tribu Cydnini Billberg, 1820

Cydus aterrimus (Forster, 1771)

Citas previas:

A Coruña: A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); A Lanzada, O Grove (Fuente, 1972a); Praia de Barra (Eiroa, 1982).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano), 26/04/2019, 1 ej. sobre una pared (JPV); As Xubias de Arriba, 6/06/2023, 1 ninfa activa en zona ruderal (JPV); Baldaio, 19/08/1982, 1♀ (JPV); Louro, 22/08/2001, 1♀ (JPV); Praia de Area Maior (Louro), 25/08/2002, 3♂♂ en las dunas (JPV); Praia de Morouzos (Ortigueira), 17/08/2023, 1 adulto y 1 ninfa en las dunas (JPV); Valdoviño, 10/10/1999, 1♀ (JPV).

Lugo: Monforte de Lemos, 15/03/2000, 1♂ (JPV); 27/05/2008, 1 ex. sobre una pared (JPV).

Ourense: Fonte da Cova (Pena Trevinca), 28/06/2007, 1♀ (JPV); Verín, 15/07/1992, 2♀♀ (JPA); Vilar de Silva, 07/07/1995, 1♂ (FPP & JPV).

Pontevedra: Illa de Arousa, 20/07/1998, 1♂ (JPV); Nanín (Sanxenxo), 15/04/2019, 1♀ (FPP); Praia de Areagrande (O Grove), 19/08/2012, 1 ej. activo en las dunas degradadas de la playa (JPV); Praia de Baltar (Portonovo), 21/07/2012, 1 ej. activo en una pasarela de madera de la playa (JPV); Praia da Lanzada (O Grove), 20/08/1997, 1♀ (JPV); Vigo, 20/08/1998, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica, introducida localmente en diversos puntos del mundo (Lis, 2006). En la Península Ibérica ampliamente distribuida (Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017). En Galicia es una especie común, especialmente en terrenos arenosos y zonas ruderales.

Cita nueva para la provincia de Lugo.

Tribu Geotomini Wagner, 1963

Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); O Grove (Fuente, 1972a).

Material estudiado:

A Coruña: Traba (Laxe), 6/04/2004, 1♀ (JPV).

Lugo: Portomarín (casco urbano), 16/03/2003, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma dispersa, especialmente en la mitad septentrional (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes & Sauleda, 1979; Vázquez & París, 1986; Ribes *et al.*, 2004).

Cita nueva para las provincias de A Coruña y Lugo.

Geotomus elongatus (Herrich-Schaeffer, 1840)

Citas previas: **A Coruña:** A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016).

Material estudiado:

Lugo: A Bastida (Monforte de Lemos), 7/11/2006, 1♂ y 2♀♀ (JPV); As Lamas (Monforte de Lemos), 13/10/1998, 1♂ y 1♀ (FPP & JPV); Os Picouzos (Monforte de Lemos), 7/08/2000, 1♀ (JPV).

Ourense: Vilar de Silva, 7/07/1995, 1♂ (FPP & JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citado de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes & Sauleda, 1979; Ribes *et al.*, 1997; Ribes *et al.*, 2004).

Citas nuevas para las provincias de Lugo y Ourense.

Geotomus petiti Wagner, 1954

Citas previas: **Pontevedra:** Pontevedra (Wagner, 1954).

Especie de distribución europea occidental (España, Francia, Italia) (Lis, 2006). En la Península Ibérica, citada de forma dispersa (Fuente, 1972a; Ribes & Sauleda, 1979; Vázquez & París, 1986; Ribes *et al.*, 2004).

No hemos visto material gallego de esta especie.

Geotomus punctulatus (A. Costa, 1847)

Citas previas: **A Coruña:** A Coruña (Fuente, 1972a); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); O Grove (Fuente, 1972a).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano), 15/01/1997, 1♀ (JPV); 15/11/2001, 1♀ (JPV); 6/05/2012, 1♂ (JPV); 16-24/09/2016, 4♂♂ y 4♀♀ (JPV); 8/09/2020, 1♀ (JPV); 26/09/2021, 1♀ (JPV); A Coruña (Eirís, casco urbano) 20/06/2017, 1♂ (JPV); A Coruña (Torre de Hércules), 11/05/2014, 1♂ (JPV); As Xubias de Arriba, 6/06/2023, 1♀ activa en zona ruderal (JPV); Baldaio, 1♂ y 2♀♀ (JPV); Lagoa de Muro (Xuño), 20/04/1996, 2♂♂ (JPV); Laxe, 5/07/2006, 3♀♀ (JPV); O Burgo, 15/05/2001, 1♂ y 1♀ (JPV); Parque do Casino (A Zapateira), 13/08/1996, 1♀ (JPV); 3/07/2000, 1♀ (JPV); 11/05/2014, 1♂ (JPV); 18/06/2019, 1♀ (JPV); Praia da Magdalena (Cabanas), 27/09/2015, 1♂ activo en el pinar (JPV); 28/08/2017, 1♀, ídem (JPV); San Pedro de Leixa (Ferrol), 18/04/2011, 1♀ sobre una pared (JPV); 25/10/2012, 1♂ (JPV); 17/10/2013, 1♀ (JPV); 8/05/2017, 1♀ (JPV).

Lugo: A Ponte do Campal, río da Veiga (Monforte de Lemos), 9/05/2007, 1♀ (JPV); As Lamas (Monforte de Lemos), 13/10/1998, 4♂♂ (JPV); 4/03/2008, 3♀♀ (JPV); Campus Universitario (Lugo), 20/09/2002, 1♀ (JPV); Lugo (casco urbano), 29/05/2003, 1♂ y 1♀ (JPV); 15/06/2003, 1♂ (JPV); 2/10/2013, 2♀♀ (JPV); 5/10/2013, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, casco urbano, 15/09/1999, 1♂ (JPV); 13/03/2000, 2♂♂ (JPV); 15/06/2002, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos (Parque dos Condes), 15/06/2013, 1♀ (JPV); O Mato (Chao do Fabeiro), 7/06/2007, 1♀ (JPV); O Rial (Serra do Miradoiro), 3/06/2004, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 10/05/2006, 1♀ (JPV); Sabarei, 7/06/2007, 1♀ activa en un camino (JPV).

Pontevedra: As Eiras, 16/06/1996, 1♀ (JPV); 8/06/1997, 1♀ bajo una tabla en terreno arenoso (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP); Nanín (Sanxenxo), 15/05/2006, 2♂♂ (FPP); 15/04/2019, 1♂ (FPP); 15/07/2020, 1♀ (FPP); 06/2021, 2♀♀ (FPP); Portonovo (Parque do Espiñeiro), 29/06/2015,

1♀ (JPV); Sanxenxo, 15/09/2010, 1♀ (FPP); Simes (Meaño), 26/04/2006, 1♀ (FPP); Vigo, 15/08/1995, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma dispersa en la mayor parte de su territorio (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel *et al.*, 2017; Gil & Grosso-Silva, 2023). En Galicia es común en terrenos arenosos, incluyendo áreas urbanas y periurbanas.

Cita nueva para la provincia de Lugo.

***Macroscytus brunneus* (Fabricius, 1803)**

Citas previas: A Coruña: A Coruña, casco urbano (Goula & Valcárcel, 2016).

Material estudiado:

Lugo: Barcia (Navia de Suarna), 8/08/1994, 1♀ (PAL).

Especie de distribución paleártica y en África tropical (Lis, 2006). En la Península Ibérica con distribución dispersa especialmente en la mitad meridional (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes & Sauleda, 1979; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel *et al.*, 2017).

Cita nueva para la provincia de Lugo.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Material estudiado:

Pontevedra: Nanín (Sanxenxo), 15/05/2006, 1♀ (FPP); Sanxenxo, 15/09/2010, 1♂ (FPP).

Especie de distribución paleártica y África tropical, introducida en USA (Lis, 2006). Citada de Andorra (Wagner, 1955) y escasamente en España, en concreto, de Cataluña y Comunidad Valenciana (Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004).

Especie nueva para Galicia, ampliando de forma considerable su área de distribución en la Península Ibérica.

Subfamilia Sehirinae Amyot & Serville, 1843

Tribu Sehirini Amyot & Serville, 1843

***Adomerus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852)**

Material estudiado:

Lugo: A Cortevella (Serra do Miradoiro) 24/04/2003, 3♂♂ (JPV); 1/06/2003, 4♂♂ y 8♀♀ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 21/07/1996, 1♂ (PAL); Ferrería de Incio, 11/06/2000, 7♂♂ y 7♀♀ (JPV); Monforte de Lemos, 20/05/1999, 1♀ (JPV); 10/05/2006, 3♂♂ y 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 11/07/2002, 1♀ (JPV); 10/05/2006, 1♂ (JPV); Vilarello, 1100 m (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 2♂♂ y 1♀ (JPV).

Pontevedra: Rial (Portonovo), 1/08/2016, 1♂ (C. Mejuto leg.).

Especie de distribución circunmediterránea (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma esporádica (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes, 1974; Ribes *et al.*, 2004).

Especie nueva para Galicia.

***Canthophorus impressus* (Horváth, 1880)**

Citas previas: Lugo: Foz (Ribes & Ribes, 2000).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica se ha citado de forma escasa, en Salamanca (González Vicente, 1978), Huesca, Lleida y Lugo (Ribes, E. & Ribes, 2000).

No hemos visto material gallego de esta especie.

***Legnotus fumigatus* (A. Costa, 1853)**

Material estudiado:

Lugo: Monforte de Lemos (jardín del Hospital Comarcal, casco urbano), 11/05/2004, 1♂ (JPV); Parada dos Montes, 26/06/2000, 1♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma escasa y dispersa (Vidal, 1949; Wagner, 1955; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004).

Especie nueva para Galicia.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Material estudiado:

Lugo: Monforte de Lemos, 10/04/1982, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004).

Especie nueva para Galicia.

***Legnotus picipes* (Fallén, 1807)**

Material estudiado:

Lugo: Alto de Pedras Apañadas (A Fonsagrada), 13/04/2004, 1♀ (JPV); Lugo (casco urbano), 17/05/2004, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 11/07/2002, 1♀ (JPV).

Pontevedra: Rial (Portonovo), 1/08/2016, 1♂ (C. Mejuto leg.); Vigo, 3/04/1997, 1♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). Escasamente citada en la Península Ibérica, con registros dispersos (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004).

Especie nueva para Galicia.

***Ochetostethus nanus* (Herrich-Schaeffer, 1834)**

Citas previas: **A Coruña:** A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016). **Lugo:** sin localidad precisa (Kerzhner, 1976). **Pontevedra:** Vigo (Chapman & Champion, 1907); sin localidad precisa (Español, 1956; Kerzhner, 1976).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano), 16/06/2008, 1♂ (JPV).

Pontevedra: Vigo, 17/07/1993, 1♀ (JPV).

Especie distribuida por las áreas sudoccidentales de la subregión mediterránea (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de forma dispersa en gran parte de su territorio (Oliveira, 1896; Gómez Menor, 1956; Vázquez & París, 1986; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004).

***Ochetostethus pygmaeus* (Rambur, 1839)**

Material estudiado:

Lugo: Parada dos Montes, 26/06/2000, 2♂♂ (JPV); Puntín (Quiroga), 4/07/2002, 1♀ (JPV).

Ourense: Santa Ana (A Limia), 11/05/1997, 1♀ (JPV).

Pontevedra: Rial (Portonovo), 1/08/2016, 4♂♂ y 1♀ (C. Mejuto leg.).

Especie de distribución mediterránea occidental (Lis, 2006). Descrita de Cádiz (Rambur, 1839), en la Península Ibérica se ha citado de otras provincias andaluzas como Almería, Córdoba, Granada y Málaga (Rosenhauer, 1856; Vela & Bastazo, 1986; Günther & Günther (2019; Ducamp *et al.*, 2024), Madrid (Bator, 1957) y Barcelona (Mederos-López *et al.*, 2014). La única cita portuguesa pertenece al distrito de Porto (Gil & Grosso-Silva, 2023).

Especie nueva para Galicia.

Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866**Material estudiado:**

A Coruña: Bembibre (Val do Dubra), 11/06/1999, 1♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica citada de Andalucía, Aragón, Cataluña y Madrid, pero con citas escasas y dispersas (Fuente, 1972a; Ribes, 1974; Vela & Bastazo, 1986; Gessé *et al.*, 1995; Ribes *et al.*, 2004). Recientemente citada de Portugal, en el distrito de Porto (Gil & Grosso-Silva, 2023).

Especie nueva para Galicia.

Sehirus morio (Linnaeus, 1761)

Citas previas: A Coruña: Vilaboa (Urquijo Landaluze, 1949).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica con amplia distribución aunque con citas dispersas y escasas (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes, 1974; Ribes *et al.*, 1997; Ribes *et al.*, 2004; Gil & Grosso-Silva, 2023).

No hemos visto material gallego de esta especie.

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

Citas previas: A Coruña: Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016), como *Tritomegas rotundipennis* (Dohrn, 1862)¹. **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a); Serra do Courel (Castro-Ferreiro & Alonso-Díaz, 2023). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano), 7/03/2014, 1♀ (JPV); Cee, 3/05/1997, 1♀ (JPV); Macenda (Encoro de Cecebre), 1♂, 1/04/2025 (JPV); Pielada (Encoro de Cecebre), 8/04/1993, 1♂ (JPV); Santiago de Compostela, 1/03/1983, 2♂♂ y 1♀ (JPV).

Lugo: Guitiriz (casco urbano), 29/03/2013, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos, 12/03/2000, 1♀ (JPV); Portomarín (casco urbano), 16/03/2003, 1♂ (JPV).

Ourense: Parada de Ribeira (Xinzo de Limia), 2/03/1997, 2♂♂ y 1♀ (JPV).

Pontevedra: Nanín (Sanxenxo), 23/02/2022, 1♀ sobre una pared (FPP).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica ampliamente distribuida aunque con citas dispersas (Oliveira, 1896; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Cita nueva para la provincia de Ourense.

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)**Material estudiado:**

Lugo: Lugo (casco urbano), 2006, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 18/05/1999, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano, Paseo de Piñeira), 17/10/2015, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Lis, 2006). En la Península Ibérica ampliamente distribuida por su mitad septentrional, aunque con citas dispersas (Oliveira, 1896; Fuente, 1972a; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Tras ser descrita de Granada (Rambur (1839), su presencia en Andalucía no ha vuelto a ser confirmada.

Cita nueva para Galicia.

¹ Revisado de nuevo, el material citado por Goula & Valcárcel (2016) como *Tritomegas rotundipennis* (Dohrn, 1862) corresponde en realidad a una hembra de *Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758) determinada de forma errónea en su momento. A la espera de nuevos datos que contradigan esta afirmación, *T. rotundipennis* debe ser excluida del catálogo de la fauna gallega.

Familia PENTATOMIDAE Leach, 1815

Subfamilia Pentatominae Leach, 1815

Tribu Aeliini Douglas & Scott, 1865

***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: A Coruña: Guísamo (Mainer, 1979); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016).

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 9/05/2017, 1♂ y 1♀ (AO) (MHNUSC); 1/07/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); 1/06/2018, 1♂ (AO) (MHNUSC); 3/05/2019, 1♀ (AO) (MHNUSC); A Vacariza (Monforte de Lemos), 10/06/1999, 1♀ (JPV); 27/08/1999, 1♂ y 2♀♀ (JPV); 19/05/2008, 1♀ (JPV); Alto de San Roque, 1270 m (O Cebreiro), 9/08/2005, 1♀ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 15/07/1996, 1♀ (LGP); 19/07/1996, 1♀ (PAL); 29/07/1996, 1♂ (PAL); Bóveda, 24/05/2006, 2♂♂ (JPV); Distriz, 3/08/2005, 1♀ (JPV); Escádebas (Guitiriz), 6/06/1993, 1♂ (JPV); Ferrería de Incio, 4/09/1994, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos, 5/09/1993, 1♀ (JPV); 9/09/1993, 1♂ y 2♀♀ (JPV); 4/06/2017, 1♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 22/08/2006, 2♂♂ y 5♀♀ (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 1♂ (JPV); Os Picouzos (Monforte de Lemos), 29/05/2002, 3♀♀ (JPV); Parque dos Lagos de Teixeira, 17/05/2005, 1♀ (JPV); Pena do Pico, 1124 m (Becerreá), 21/09/2005, 2♂♂ (JPV); Reboredo (Vilalba), 10/09/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 10/05/2006, 5♂♂ y 2♀♀ (JPV); Santa Comba (río Chamoso), 16/05/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); Seceda (Serra do Courel), 12/09/1999, 1♂ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 1♂ y 2♀♀ (PAL); Serra da Vacariza, 29/09/2004, 1♂ (JPV); Vilaescura (Sober), 26/04/2006, 3♂♂ y 4♀♀ (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♂ y 2♀♀ (JPV); Balneario de Requeixo (Verín), 6/04/1993, 1♂ (JPV); Encoro de San Martiño, 11/07/1993, 5♂♂ (JPV); Montecelo (Serra do Larouco), 2/03/1997, 1♂ y 1♀ (JPV); Portela do Trigal, 14/07/1998, 1♀ (LGP).

Pontevedra: A Ramallosa, 28/07/1996, 3♀♀ (PAL); Fragoselo (Vigo), 24/09/1997, 1♂ (PAL); Praia de Baltar (Portonovo), 20/07/2013, 1♀ (JPV).

Especie de distribución euromediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). Citada de forma dispersa en casi toda la Península Ibérica (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Valcárcel *et al.*, 2017).

Cita nueva para las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

***Aelia rostrata* Boheman, 1852**

Citas previas: Pontevedra: Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003).

Material estudiado:

Ourense: Casaio, 24/07/1994, 1♂ y 7♀♀ (JPV); Encoro de San Martiño, 11/07/1993, 1♂ (JPV); Valborrás (Carballeda de Valdeorras), 15/07/1998, 1♂ (LGP); Viladequinta (Carballeda de Valdeorras), 24/07/1994, 2♂ (JPV).

Especie euromediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península Ibérica con numerosas citas dispersas por casi toda su geografía (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006).

Primeras citas para la provincia de Ourense.

***Neottiglossa bifida* (A. Costa, 1847)**

Citas previas: Lugo: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Ourense: Ourense (Fuente, 1974). Pontevedra: Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: A Vacariza (Monforte de Lemos), 10/06/1999, 1♀ (JPV); 27/08/1999, 3♂♂ (JPV); As Lamas (Monforte de Lemos), 7/07/1999, 2♀♀ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 14/09/1995, 1♂ (PAL); 15/07/1996, 1♀ (LGP); Distriz, 3/08/2005, 2♂♂ y 2♀♀ (JPV); Liber (Becerreá), 23/07/1994, 2♂♂ y 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 10/04/1982, 1♀ (JPV); 9/09/1993, 1♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 31/05/2006, 2♀♀ (JPV); Navia de Suarna, 14/09/1995, 1♂ (PAL); Os Picouzos (Monforte de Lemos), 29/05/2002, 2♂♂ (JPV); Outeiriño (Monforte de Lemos), 24/05/2016, 2♀♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 6/06/2006, 1♂ y 2♀♀ (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 2♂♂ (JPV); Encoro de San Martiño, 11/07/1993, 1 ej. (JPV); Portela do Trigal, 14/07/1998, 1♂ (LGP); Viladequinta (Carballeda de Valdeorras), 24/07/1994, 8♂♂ y 2♀♀ (JPV).

Pontevedra: As Eiras, 23/07/1998, 1♀ (JPV); Cabral (Vigo), 12/07/1999, 1♀ (LGP); Carboeiro, 14/06/1992, 1♂ (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP).

Especie de distribución circunmediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península Ibérica ampliamente citada aunque de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas concretas de la provincia de Lugo.

***Neottiglossa flavomarginata* (Lucas, 1849)**

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie pontomediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península Ibérica citada de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

No hemos visto material gallego de esta especie.

***Neottiglossa leporina* (Herrich-Schaeffer, 1830)**

Citas previas: **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: As Lamas (Monforte de Lemos), 7/07/1999, 1♀ (JPV); Distriz, 21/06/1999, 1♂ (JPV); 3/08/2005, 1♂ (JPV); Freixo, 900 m (Serra do Ouribio), 29/05/2003, 11♂♂ y 12♀♀ (JPV); Monforte de Lemos, 9/09/1993, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 15/08/1999, 1♂ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 22/08/2006, 7♂♂ y 3♀♀ (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 1♀ (JPV); Os Picouzos (Monforte de Lemos), 29/05/2002, 2♂♂ (JPV); Pico do Forno de Martín, 860 m (Serra de Meira), 4/08/2003, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 7/08/2003, 1♂ (JPV); Seceda (Serra do Courel), 12/09/1999, 1♂ (JPV).

Ourense: Cabeza Grande de Manzaneda, 1425 m, 12/08/1999, 1♀ (LGP); Pozo do Lago (Maside), 9/07/1999, 7♂♂ y 5♀♀ (LGP); Serra do Invernadoiro, 1/07/1997, 2♂♂ (JPV).

Pontevedra: Agolada, 26/06/1995, 2♀♀ (JPV); Paredes (A Caniza), 15/06/1996, 1♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica septentrional (Derjanschi & Péricart, 2005). Ampliamente distribuida en la Península Ibérica, aunque con citas dispersas (Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Cita nueva para la provincia de Pontevedra y primeras localidades concretas para las de Lugo y Ourense.

***Neottiglossa lineolata* (Mulsant & Rey, 1852)**

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: Ribasaltas (Monforte de Lemos), 21/05/2003, 1♂ (JPV).

Ourense: Pozo do Lago (Maside), 09/07/1999, 2♂♂ (LGP).

Especie pontomediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península Ibérica citada de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie nueva para las provincias de Lugo y Ourense.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 15/05/2018, 1♂ (AO) (MHNUSC); A Vacariza (Monforte de Lemos), 27/07/1999, 1♀ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 29/07/1996, 1♀ (PAL); Graveiras de Cadórniga (Monforte de Lemos), 8/06/2005, 1♀ (JPV); Parque dos Lagos de Teixeira, 5/06/2005, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 6/06/2006, 1♂ (JPV); Serra da Vacariza, 29/09/2004, 1♂ (JPV); Vilarello (Serra dos Ancares), 24/06/2004, 1♀ (JPV).

Ourense: Encoro de San Martiño, 11/07/1993, 1♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica septentrional (Derjanschi & Péricart, 2005). Se encuentra citada en forma aislada de casi toda la geografía ibérica (Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Citas nuevas para Lugo y Ourense.

Tribu Aulacetrini Mulsant & Rey, 1866
***Holcogaster fibulata* (Germar, 1831)**

Citas previas: **A Coruña:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017).

Material estudiado:

A Coruña: Louro, 10/07/2005, 1♂ en pinar costero (JPV).

Lugo: Alto do Aldriz (Quiroga), 17/05/2002, 1♀ (JPV).

Elemento holomediterráneo (Ribes & Pagola, 2013). Citada ampliamente en la Península Ibérica, aunque de forma dispersa, mayoritariamente en la mitad oriental y meridional (Fuente, 1974; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Cita nueva para la provincia de Lugo y primera localidad concreta para A Coruña.

Tribu Cappaeini Atkinson, 1888
***Halyomorpha halys* (Stål, 1855)**

Citas previas: **A Coruña:** Padrón (Tanco, 2024). **Ourense:** Ourense (carretera de Vigo) (Tanco, 2024). **Lugo:** A Pontenova (Tanco, 2024). **Pontevedra:** Arbo, O Porriño, Pontevedra, Santo Tomé de Freixeiro, Tui, Vigo (Tanco, 2024).

Especie originaria del este de Asia, registrada por primera vez en Europa en el 2004, en Suiza, y posteriormente citada de forma progresiva de varios países de Europa central y meridional (Roca-Cusachs *et al.*, 2018a). En la Península Ibérica, citada por primera vez por Dioli *et al.* (2016) de la provincia de Girona. Actualmente en expansión con citas en gran parte de su territorio, todas las citas gallegas previas proceden de registros fotográficos recopilados por Tanco (2024).

No hemos visto hasta el momento material gallego de esta especie.

Tribu Carporini Mulsant & Rey, 1866

***Antheminia absinthii* (Wagner, 1952)**

Citas previas: Pontevedra: A Lanzada, O Grove (Fuente, 1974).

Material estudiado:

Pontevedra: San Vicente do Grove, 18/07/1994, 4♂♂ (JPV).

Especie que ocupa el noroeste de la cuenca mediterránea (Ribes & Pagola, 2013). En la Península Ibérica citada de forma dispersa (Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Ducamp *et al.*, 2024).

***Antheminia lunulata* (Goeze, 1778)**

Citas previas: Pontevedra: sin localidad precisa (Español, 1956).

Material estudiado:

Pontevedra: Ardia (O Grove), 27/08/1997, 1♀ (JPV).

Especie paleártica (Ribes & Pagola, 2013). En la Península citada de forma dispersa (Ribes *et al.*, 2004; Ribes & Pagola, 2013). Estos autores indican, sin embargo, que las citas antiguas no verificadas podrían corresponder a *A. absinthii*.

Primera cita precisa para Galicia, en la provincia de Pontevedra.

***Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum* (Rambur, 1839)**

Citas previas: Pontevedra: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie euromediterránea (Ribes & Pagola, 2013). La subespecie nominal es de distribución ibérica oriental y meridional (Ribes & Schmitz, 1992; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola-Carte, 2013). La cita previa de Roca-Cusachs & Goula (2017a) no concuerda con esta interpretación.

No hemos visto ejemplares gallegos de esta especie.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1851)**

Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1958

Carpocoris (Carpocoris) mediterraneus atlanticus Tamanini, 1958

Citas previas: **A Coruña:** Santiago de Compostela (Fuente, 1974). **Lugo:** sin precisión (Ribes, 1982); Barcia (Navia de Suarna), Monforte de Lemos (Ribes *et al.*, 2007); Serra do Courel (Castro-Ferreiro & Alonso-Díaz, 2023). **Ourense:** Rubiá (Gómez Menor, 1956). **Pontevedra:** Illa Sur, Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003); sin precisión (Ribes & Pagola-Carte, 2013).

Material estudiado:

A Coruña: Lariño, 23/08/2001, 1♂ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 8/05/2019, 2♂♂ (AO) (MHNUSC); 17/05/2020, 1♂ (AO) (MHNUSC); 9/06/2020, 1♂ (AO) (MHNUSC); 29/06/2020, 3♂♂ y 1♀ (AO) (MHNUSC); Alto do Couto, 1340 m (Serra do Courel), 30/09/2016, 1♂ (EFV & ARF); Barcia (Navia de Suarna), 15/07/1996, 2♂♂ y 3♀♀ (LGP); 19/07/1996, 2♂♂ y 4♀♀ (PAL); 20/07/1996, 2♀♀ (LGP); 29/07/1996, 9♂♂ y 11♀♀ (PAL); Becerreá, 24/07/1999, 1♂ (JPV); Bóveda, 24/05/2006, 1♀ (JPV); Cortes (Serra do Courel), 24/07/1999, 1♂ (JPV); Distriz, 21/06/1999, 1♂ (JPV); Froxán (Serra do Courel), 21/06/2001, 1♂ (JPV); Liber (Becerreá), 23/07/1994, 2♂♂ (JPV); Monforte de Lemos, 9/09/1993, 6♂♂ (JPV); 15/03/2000, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 15/08/1999, 1♂ (JPV); Monterroso, 10/09/1993, 1♀ (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 1♂ y 3♀♀ (JPV); O Saviñao, 6/09/1993, 1♀ (JPV); Reboredo (Vilalba), 10/09/1993, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 11/07/2002, 1♀ (JPV); San Xoán de Chavaga (Monforte de Lemos), 9/08/2006, 1 ex. sobre *Carduus* sp. (JPV); Santa Comba (río Chamoso), 16/05/1993, 3♂♂ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 6♀♀ (PAL).

Ourense: Alto do Vieiro, 924 m (Bande), 1/06/2025, 1♂ sobre *Galactites tomentosus* (FPP & JPV); Cabeza Grande de Manzaneda, 1425 m, 12/08/1999, 8♂♂ y 2♀♀ (LGP); Fonte da Cova (Pena Trevinca), 14/07/1998, 1♂ y 1♀ (LGP); Oulego, 3/07/1995, 1♂ (JPV); 14/04/2001, 1♂ (JPV); Portela do Trigal, 19/07/1998, 1♀ (LGP); Pozo do Lago (Maside), 9/07/1999, 1♂ (LGP); Santo Estevo de Ribas de Miño, 14/04/1995, 1♂ (JPV); Santa Ana (A Limia), 11/05/1997, 1♂ (JPV); Verín, 15/08/1998, 1♀ (JPA); 15/07/1999, 1♂ y 1♀ (JPA); 15/07/2002, 1♂ (JPA); Viladequinta (Carballada de Valdeorras), 24/07/1994, 1♀ (JPV).

Pontevedra: A Ramallosa, 25/06/1995, 1♀ (PAL); Ardia (O Grove), 27/08/1997, 2♂♂ (FPP); As Eiras, 7/08/1997, 1♂ (LGP & JPV); Carregal (Tomiño), 7/08/1997, 1♂ sobre *Carduus* sp. (JPV); Cuntumil (Sanxenxo), 30/05/2004, 1♂ (FPP); Donón (Cangas do Morrazo), 6/05/1996, 1♂ (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP); Nanín (Sanxenxo), 02/2023, 1♀ (FPP); Nantes (Sanxenxo), 25/07/2006, 1♂ (FPP); O Grove, 03/2022, 1♀ (FPP); Simes (Meaño), 26/04/2006, 1♂ y 1♀ (FPP).

Elemento paleártico, ocupa toda la Península siendo más común en el norte (Oliveira, 1896; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Valcárcel *et al.*, 2017).

Es una de las especies de pentatómidos más abundante y extendida en Galicia, donde probablemente ocupe todo su territorio, desde el nivel del mar a las cimas de mayor altitud.

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

Citas previas: Lugo: Barcia (Navia de Suarna) (Ribes *et al.*, 2007).

Material estudiado:

Lugo: Barcia (Navia de Suarna), 7/08/1994, 1♀ (PAL); Parque dos Lagos de Teixeira, 5/06/2005, 1 ej. (JPV).

Ourense: Santa Ana (A Limia), 11/05/1997, 1♂ (JPV).

Pontevedra: A Ramallosa, 30/04/1995, 2♂♂ (PAL); 17/08/1995, 1♂ (PAL).

Especie de distribución paleártica septentrional (Ribes & Pagola, 2013), aparentemente limitada a la mitad norte en la Península Ibérica (Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013). Existen algunas citas andaluzas antiguas (Rambur, 1839; Medina Ramos, 1895) aunque no parecen haberse confirmado posteriormente.

Citas nuevas para Ourense y Pontevedra.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Carpocoris verbasci (De Geer, 1773)

Citas previas: **A Coruña:** Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879); A Coruña (Urquijo Landaluze, 1956); Santiago de Compostela (Fuente, 1974); Guísamo (Mainer, 1979); Lago de Meirama (Vieira Lanero *et al.*, 2015); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016). **Lugo:** Triacastela (Ribes & Pagola-Carte, 2013); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** Manzaneda (Remane & Kammerschen, 1991b); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: As Xubias de Arriba, 26/06/2023, 1♀ sobre *Hirschfeldia incana* (JPV); Bembibre (Val do Dubra), 11/06/1994, 3♂♂ (JPV); Betanzos, 12/08/1996, 1♂ (PAL); Monte Cedeira (Cerdeada), 31/03/1991, 1♀ (JPV); Portomouros, 9/08/1996, 2♀♀ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 16/06/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); 15/06/2018, 1♂ (AO) (MHNUSC); 7/05/2020, 1♂ (AO) (MHNUSC); A Seara (Alfoz), 6/09/1992, 1♂ (JPV); Alto do Couto, 1340 m (Serra do Courel), 11/05/2015, 1♀ en trampa de luz ultravioleta (EFV & ARF); Barcia (Navia de Suarna), 14/09/1995, 4♂♂ y 2♀♀ (PAL); 15/07/1996, 1♂ y 1♀ (LGP); 17/07/1996, 5 ej. (PAL); 19/07/1996, 1♀ (JPV); 20/07/1996, 1♀ (LGP); 29/07/1996, 5♂♂ y 6♀♀ (PAL); San Xoán de Chavaga (Monforte de Lemos), 9/08/2006, 1 ej. sobre *Carduus* sp. (JPV); Distriz (Monforte de Lemos), 19/03/1993, 1♀ (JPV);

25/06/1995, 1♀ (JPV); 3/06/2008, numerosos ejs. sobre diversas plantas (JPV); Doiras (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 1♂ (JPV); Escádebas (Guitiriz), 6/06/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); Ferrería de Incio, 4/09/1994, 1♀ (JPV); Lugo (casco urbano), 5/05/1995, 1♀ (PAL); Lugo, 1/03/1995, 1♀ (PAL); Monforte de Lemos, 5/09/1993, 1♀ (JPV); 9/09/1983, 2♂♂ y 2♀♀ (JPV); 9/09/1993, 2♀♀ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 14/06/1999, 1♂ (JPV); Montefurado, 7/07/1993, 1♂ (JPV); Monterroso, 10/09/1993, 4♂♂ y 2♀♀ (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 1♂ (JPV); Pedreda, 5/04/1995, 1♂ (PAL); 25/04/1995, 2♀♀ (PAL); 7/05/1995, 3♂♂ y 4♀♀ (PAL); 25/05/1995, 2♀♀ (PAL); Pena do Pico, 1124 m (Becerreá), 21/09/2005, 1 ej., (JPV); Piño (Monforte de Lemos), 9/08/2006, 1 ej. sobre *Dipsacus* sp. (JPV); Piornedo (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 3 ej. (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 13/08/2017, 1♂ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 12♂♂ y 10♀♀ (PAL); Viladiciente (Serrón da Pedra da Hedra), 13/05/2006, 1 ej. (JPV); Vilarello, 1100 m (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 1♂ (JPV); 25/06/2004, 1♀ (JPV); Xullán (Bóveda), 27/07/2006, 1 ej. sobre *Verbascum* sp. (JPV).

Ourense: Cabeza Grande de Manzaneda, 1425 m, 12/08/1999, 2♂♂ y 2♀♀ (LGP); Casaio, 24/07/1994, 1♂ y 1♀ (JPV); Ourense (casco urbano), 16/04/1992, 1 ej. (JPV); Pena Trevinca, 14/07/1998, 1♀ (PAL); Santa Ana (A Limia), 17/05/1997, 2♂♂ (JPV); Valborrás (Carballeda de Valdeorras), 15/07/1998, 2♂♂ (LGP); Vilar de Silva, 7/07/1995, 1♂ (FPP & JPV).

Pontevedra: A Ramallosa, 30/04/1995, 1♂ y 1♀ (PAL); 25/06/1995, 1♀ (PAL); 28/07/1996, 2♀♀ (PAL); A Serpe (Poio), 23/07/2020, 1♀ (FPP); Nanín (Sanxenxo), 15/05/2006, 1♀ (FPP); Paredes (A Caniza), 15/06/1996, 3♂♂ y 1♀ (JPV).

Especie paleártica septentrional (Ribes & Pagola, 2013). Ocupa toda la Península (Oliveira, 1896; Wagner, 1955; Fuente, 1974; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

Otra de las especies de pentatómidos más abundante y extendida en Galicia, donde probablemente ocupe todo su territorio, desde el nivel del mar a las cimas de mayor altitud.

Holcostethus (Holcostethus) albipes (Fabricius, 1781)

Material estudiado:

Pontevedra: Praia de Areas (Sanxenxo), 21/08/2019, 1♀ (FPP).

Elemento mediterráneo (Ribes & Pagola, 2013). En la Península Ibérica, especie citada en la región oriental y meridional (Ribes *et al.*, 2004; Ribes & Pagola, 2013), a excepción de una cita de Cáceres (Viskens & Bruers, 2009).

Especie nueva para Galicia, ampliando considerablemente su distribución ibérica conocida.

Holcostethus (Holcostethus) sphacelatus (Fabricius, 1794)

Citas previas: Pontevedra: Pontevedra (Chapman & Champion, 1907).

Especie de distribución euromediterránea (Ribes & Pagola, 2013), citada en la Península Ibérica de forma dispersa por casi todo su territorio (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Pagola & Ribes, 2007; Ribes & Pagola, 2013).

No hemos visto material gallego de esta especie.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)²

Citas previas: A Coruña: Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879); A Coruña (Fuente, 1974); Lago de Meirama (Vieira Lanero *et al.*, 2015, como *Palomena viridissima*); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel,

² Según Ribes & Pagola (2013), *Palomena viridissima* (Poda, 1761) es una especie no presente en la Península Ibérica. La mayoría de las citas ibéricas de *P. viridissima* han de adscribirse por tanto a *P. prasina* o, en el caso de las más meridionales, a *Palomena formosa* Vidal, 1940.

2016). **Lugo**: Serra do Courel (Alonso Díaz *et al.*, 2019; Castro-Ferreiro & Alonso-Díaz, 2023). **Ourense**: Ourense (Fuente, 1974). **Pontevedra**: Vigo (Chapman & Champion, 1907, como *P. viridissima*; Fuente, 1974).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano), 20/04/2016, varios ej. en calles del centro; 6/07/2016, 1 ej. (JPV); 14/06/2017, 1♂ y 1♀ en cópula sobre *Buddleja davidii* (JPV); Barrio de San Lázaro (Santiago de Compostela), 28/11/2007, 1 ej. (JPV); Central de Zarzo (río Mandeo), 7/04/1991, 1♂ (JPV); Couto de Chelo, 18/10/1987, 1 ej. (JPV); 4/08/1995, 1♂ (JPV); Meicende, 30/06/1983, 1♀ (JPV); Portomouros, 9/08/1996, 1♂ (JPV); Praia de Barrañán, 12/05/2013, 1♀ muerta en la playa (Marta Pérez leg.).

Lugo: A Fonsagrada, 9/07/2016, 1♀ (AO) (MHNUSC); 8/06/2017, 1♂ (AO) (MHNUSC); 15/06/2018, 1♀ (AO) (MHNUSC); 15/06/2019, 1♀ (AO) (MHNUSC); 11/05/2020, 1♀ (AO) (MHNUSC); Bascuas (Parga), 15/08/1999, 1♀ (JPV); Distriz (Monforte de Lemos), 27/05/2008, 1♂ (JPV); Encoro de Vilasouto, 25/07/1997, 1♀ (JPV); Fisteus (Serra do Courel), 29/03/1997, 2♀♀ (JPV); Froxán (Serra do Courel), 13/06/2000, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos, 15/10/1999, 1♂ y 2♀♀ (JPV); O Saviñao, 6/09/1993, 1♂ (JPV); Pedreda, 5/04/1995, 2♂♂ y 1♀ (PAL); 8/05/1996, 1♂ y 1♀ (PAL); Piornedo (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 1♂ (JPV).

Pontevedra: As Eiras, 17/04/1994, 1♀ (JPV); Fragoselo (Vigo), 6/12/1993, 1♂ (PAL); 29/09/1997, 1♀ (JPV); Moreira (Pontearreas), 10/1996, 1♀ (L. Babío leg.); Nanín (Sanxenxo), 12/03/2006, 1♂ (FPP); 15/05/2006, 1♀ (FPP); O Santo (Sanxenxo), 17/05/2004, 1♀ (FPP); 20/04/2026, 1 ej. (FPP); Pontearreas, 29/04/1993, 1♀ (M.L. Pita leg.).

Elemento eurosiberiano (Ribes & Pagola, 2013). Especie común en toda la Península Ibérica (Wagner, 1955; Fuente, 1974; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013), excepto en el sur, donde es sustituida por *Palomena formosa* Vidal, 1940.

Peribalus (Peribalus) strictus strictus (Fabricius, 1803)

Citas previas: **A Coruña**: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Lugo**: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense**: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra**: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 10/06/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); 2/06/2018, 1♂ y 1♀ (AO) (MHNUSC); Alto do Poio, 1474 m (Serra do Rañadoiro), 13/05/2003, 1♀ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 15/07/1996, 1♂ (LGP); Distriz (Monforte de Lemos), 6/10/1990, 1♀ (JPV); Escádebas (Guitiriz), 6/06/1993, 1♀ (JPV); Lugo (casco urbano), 13/10/2003, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos, 15/10/1999, 1♂ (JPV); 15/01/2000, 1♀ (JPV); Os Picouzos (Monforte de Lemos), 29/05/2002, 1♂ (JPV); Outeiriño (Monforte de Lemos), 24/05/2006, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 13/08/2017, 1♀ (JPV); Santa Comba (río Chamoso), 16/05/1993, 1♂ (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♀ (JPV); Verín, 15/07/2001, 1♂ (J.P. Arias leg.).

Pontevedra: Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 2♀♀ (FPP).

Especie de distribución eurosiberiana (Ribes & Pagola, 2013). Citada de forma dispersa en casi toda la Península (Fuente, 1974; Wagner, 1955; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras localidades concretas para Galicia, de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Staria lunata (Hahn, 1835)

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 30/06/2019, 1♀ (AO) (MHNUSC); Arexo (A Fonsagrada), 23/05/2020, 2♀♀ (AO) (MHNUSC); Babela (Monforte de Lemos), 7/08/2001, 2♀♀ (JPV); Puntín (Quiroga), 4/07/2002,

1♂ y 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 10/05/2006, 2♂♂ y 1♀ (JPV); Vilarello, 1100 m (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 1♀ (JPV).

Ourense: Viladequinta (Carballeda de Valdeorras), 24/07/1994, 1♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica occidental (Ribes & Pagola, 2013). Ocupa casi toda la Península Ibérica (Oliveira, 1896; Wagner, 1955; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Especie nueva para Galicia.

Tribu Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Citas previas: **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: Ardaña (Carballo), 14/04/1994, 1♂ y 3♀♀ (JPV).

Lugo: A Cortevella (Serra do Miradoiro), 20/06/2005, 1♀ (JPV); A Seara (Alfoz), 6/04/1992, 1♂ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 21/07/1996, 1♂ (PAL); Navia de Suarna, 14/09/1995, 1♂ (PAL).

Pontevedra: As Eiras, 1/08/2004, 2♂♂ (FPP); Nanín (Sanxenxo), 15/04/2019, 1♀ (FPP); Paredes (A Caniza), 6/06/1996, 1♂ (JPV); Praia de Baltar (Portonovo), 20/07/2013, 1♂ (JPV).

Especie de distribución euromediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005). Citada escasamente en la franja septentrional de la Península Ibérica (Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023). Existen también citas antiguas de Cáceres y Sevilla (Hernández Pacheco, 1895; Medina Ramos, 1895), pero no conocemos ninguna meridional más.

Cita nueva para la provincia de A Coruña y primeras localidades concretas de Lugo y Pontevedra.

Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)

Eysarcoris inconspicuus (Herrich-Schaeffer, 1844)

Citas previas: **A Coruña:** Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** Tui (Seabra, 1930); A Canosa, A Guarda (Gómez Menor, 1956); O Grove (Bator, 1957).

Material estudiado:

Lugo: A Cortevella (Serra do Miradoiro), 20/06/2005, 1♀ (JPV); Baralla, 25/06/2004, 1♀ (JPV); Distriz (Monforte de Lemos), 23/04/2002, 1♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 22/08/2006, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 16/04/2003, 1♂ (JPV).

Ourense: Pozo do Lago (Maside), 9/07/1999, 1♂ (LGP).

Pontevedra: As Eiras, 23/07/1998, 1♀ (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP); Nanín (Sanxenxo), 15/07/2004, 1♀ (FPP); Sanxenxo, 15/09/2010, 1♀ (FPP).

Elemento eurosiberiano y afro-turánico-mediterráneo (Derjanschi & Péricart, 2005). Especie citada en casi toda la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Valcárcel *et al.*, 2017).

Cita nueva para la provincia de Lugo.

Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776)

Citas previas: **Lugo:** Serra do Courel (Alonso Díaz *et al.*, 2019).

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 1/07/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); 8/05/2019, 1♂ (AO) (MHNUSC); Monforte de Lemos, 15/08/1986, 1♂ (JPV); Parada dos Montes, 23/08/1995, 1♂ sobre *Urtica* sp. (JPV); Ribasaltas

(Monforte de Lemos), 11/07/2002, 1♂ y 1♀ (JPV); 21/05/2003, 2♂♂ (JPV); 7/08/2003, 1♂ (JPV); 10/05/2006, 1♀ (JPV); 6/06/2006, 1♀ (JPV); Seoane (Monforte de Lemos), 14/05/2002, 1♂ (JPV).

Ourense: O Barco de Valdeorras, 4/04/1993, 1♂ (JPV).

Pontevedra: Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP).

Distribuido por casi toda Europa media y meridional, Cáucaso, Transcaucasia, Marruecos y Argelia (Derjanschi & Péricart, 2005). Se distribuye por gran parte de la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1974; Ribes & Goula, 1995; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009b; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

Especie nueva para las provincias de Ourense y Pontevedra.

Tribu Mecideini Distant, 1902

Mecidea lindbergi Wagner, 1954

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie de distribución afrotropical y erémica, con citas ocasionales en Europa mediterránea (Derjanschi & Péricart, 2005) También citada como especie migrante en Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Países Bajos (Aukema, 2026). En la Península, registrada de Sevilla y Portugal, además de un registro previo de Pontevedra (Roca-Cusachs & Goula, 2017a) que, probablemente, se deba a una introducción accidental.

No hemos visto material gallego de esta especie.

Tribu Pentatomini Leach, 1815

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Citas previas: **A Coruña:** A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016). **Lugo:** Lugo (Fuente, 1975); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** Beade (Urquijo Landaluze, 1937); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** Tui (Seabra, 1930); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003).

Material estudiado:

A Coruña: Baio, 11/11/1990, 1♀ (JPV); Castro de Elviña, 4/023/2026, 1 ej. bajo corteza de eucalipto (JPV); Finca Romarís (Bastabales, Brión), 18/07/1992, 1♀; 3/09/1992, 2♂♂ y 2♀♀; 17/09/1992, 2♀♀ en trampa de luz (Santamaría leg.); Pontecalbar, 9/03/1994, 1♂ (JPV); A Coruña (Torre de Hércules), 5/08/2018, 2♂♂ y 1♀ atraídos por la iluminación viaria (EFV & ARF).

Lugo: Barcia (Navia de Suarna), 6/09/1994, 1♂ (PAL); 15/08/2017, 3♂♂ y 1♀ (PAL); Monforte de Lemos, 20/08/1985, 1♂ (JPV); 10/10/1986, 1♀ (JPV); 15/06/2000, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 15/08/1999, 1♀; 15/09/1999, 1♀ (JPV); 15/10/2001, 1♂ (JPV); Seceda (Serra do Courel), 12/09/1999, 1♀ (JPV).

Ourense: Ourense (casco urbano), 16/04/1992, 2♂♂ y 4♀♀ (JPV); Vilariño (O Barco de Valdeorras), 21/08/2013, 1♀ atraída por luz u.v. (AFV & ARF).

Pontevedra: A Ramallosa, 25/08/1994, 1♂ y 1♀ (PAL); 13/08/1995, 2♂♂ (PAL); 25/08/1995, 1♂ (PAL); 28/07/1996, 1♂ (PAL); As Eiras, 17/04/1994, 1 ej. (JPV); Moreira (Ponteareas), s/f, 1♂ (L. Babío leg.); Nanín (Sanxenxo), 15/11/2004, 1♀ (FPP); 15/05/2006, 1♀ (FPP); 15/09/2019, 1♂ (FPP); 15/07/2020, 1♀ (FPP); San Vicente do Grove, 25/09/1993, 1♂ y 2♀♀ (S. Devesa leg.); Vigo, 21/10/1994, 1♀ (JPV).

Especie casi cosmopolita, introducida en muchos países con el transporte de mercancías (Ribes & Pagola, 2013). Presente en casi toda la Península Ibérica (Oliveira, 1896; Fuente, 1975; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

***Pentatoma (Pentatoma) rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: **A Coruña:** Lago de Meirama (Vieira Lanero *et al.*, 2015); A Coruña (casco urbano) (Goula & Valcárcel, 2016); Carral (Carral *et al.*, 2022). **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** Lalín (Gómez Menor, 1956).

Material estudiado:

A Coruña: Finca Romarís (Bastabales, Brión), 5/09/1992, 1♀ (Santamaría leg.).

Lugo: Alto do Couto, 1340 m (Serra do Courel), 9/08/2016, 4♂♂, luz ultravioleta (EFV & ARF); Bascuas (Parga), 15/08/1999, 1♂ y 1♀ (JPV); Fonte de Carbedo (Folgo do Courel), 10/08/2015, 1♂, luz ultravioleta (EFV & ARF); 10/08/2015, 1♂, luz ultravioleta (EFV & ARF); 23/08/2017, 1♂, luz ultravioleta (EFV & ARF); Lugo (casco urbano), 13/10/2003, 1♂ (JPV); Monforte de Lemos, 15/10/1999, 1♂ (JPV); 15/10/2000, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 16/10/2015, 1ej. (JPV); Monte Pradairo, 1029 m (Serra do Miradoiro), 26/10/2004, 1♂ (JPV).

Ourense: A Rúa, 13/10/1998, 1♀ (JPV); O Barco de Valdeorras, 12/10/1996, 1♀ (JPV).

Especie paleártica (Ribes & Pagola, 2013). En la Península Ibérica ampliamente distribuida en la mitad septentrional (Oliveira, 1896; Fuente, 1975; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Algunas citas antiguas de Almería (Gómez Orland, 1880) o Faro (Pissarro, 1951) no se han confirmado con otros registros meridionales.

Primeras citas concretas para las provincias de Lugo y Ourense.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Rhaphigaster griseus (Fabricius, 1794)

Citas previas: **A Coruña:** Fonteculler (Urquijo Landaluze, 1937); Rutis (Ruiz Castro, 1943); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Lugo:** Monforte de Lemos (casco urbano) (Valcárcel, 2009). **Ourense:** Ourense (casco urbano) (Valcárcel, 2009). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: Central de Zarzo (río Mandeo), 24/02/1991, 1♂ y 1♀ (JPV); Couto de Chelo, 26/06/1983, 1♂ (JPV); Parque do Casino (A Zapateira), 5/04/2014, 1 ej. sobre el tronco de un plátano de sombra (JPV); Parque Martí (Santa Cristina, Perillo), 2/12/2011, 1 ej. invernando en una hendidura de la corteza de un sauce (*Salix* sp.) (JPV); Santiago de Compostela, 9/04/1984, 1♀ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 15/11/2016, 2♂♂ (AO) (MHNUSC); 17/01/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); Castroverde, 29/10/2006, 1 ej. (JPV); Monforte de Lemos, 1/11/1996, 1♀ (J.P. Arias leg.); 15/11/2000, 1♂ (JPV); O Ceao, 28/10/2006, 1 ej. (JPV); Rubián, 22/03/2006, varios ejs. agrupados bajo la corteza de un pino quemado (FPP & JPV); Seoane (Monforte), 31/05/2006, 1 ej. (JPV).

Ourense: Alto de Penagache, 1226 m (Quintela de Leirado), 27/10/2025, varios ejemplares activos sobre la cruz que corona la cumbre (FPP & JPV); Alto do Vieiro, 924 m (Bande), 21/03/2025, varios grupos invernantes bajo piedras al pie de aerogeneradores; 28/10/2025, centenares de ejemplares activos, cubriendo la parte media-baja de cada uno de los aerogeneradores (FPP & JPV); Viladequinta (Carballeda de Valdeorras), 6/07/1994, 1♀ (JPV).

Pontevedra: As Eiras, 12/08/1998, 1 ninfa (C. Mejuto leg.); Dorrón (Sanxenxo), 29/01/2026, 2 ejs. bajo corteza de eucalipto (FPP); Nanín (Sanxenxo), 12/03/2021, 1♀; 23/02/2022, 1♂ sobre una pared (FPP); Paredes (A Caniza), 1/06/1996, 1♀ (JPV); Portonovo (Parque do Espiñeiro), 2 ejs. bajo corteza de plátano de sombra (FPP).

Especie euromediterránea extendida hacia Asia Central (Ribes & Pagola, 2013). Casi toda la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1975; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Ribes & Pagola, 2013; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

Primeras citas concretas para la provincia de Pontevedra.

Tribu Piezodorini Atkinson, 1888

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)

Citas previas: Lugo: Triacastela (Ribes & Pagola-Carte, 2013). Pontevedra: Pontevedra (Chapman & Champion, 1907).

Material estudiado:

A Coruña: Rego do Castro (A Zapateira), 28/08/2022, 1♂ vareando *Quercus* sp. (JPV); Central de Zarzo (río Mandeo), 7/04/1991, 1♀ (JPV); Encoro de Cecebre, 26/02/2026, 1♂ sobre *Ulex* (JPV); Monte Cova da Serpe, 8/06/1991, 1♀ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 14/06/2020, 1♀ (AO) (MHNUSC); Bascuas (Parga), 18/06/2000, 1♀ (JPV); Degrada (Serra dos Ancares), 4/04/1993, 2♂♂ y 1♀ sobre *Genista* sp. (JPV); Distriz (Monforte de Lemos), 19/03/199, 7♂♂ y 1♀ (JPV); Lugo, 10/05/1995, 1♀ (PAL); Lugo (Campus Universitario), 5/05/1995, 1♂ y 3♀♀ (PAL); Monforte de Lemos, 26/10/1986, 1 ej. (JPV); Monterroso, 10/09/1993, 1♂ y 3♀♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 22/08/2006, 1 ej. batiendo *Quercus* sp. (FPP & JPV); Pedreda, 5/04/1995, 1♀ (PAL); 7/05/1995, 1♀ (PAL); Piño (Monforte de Lemos), 9/08/2006, 1 ej. sobre *Alnus* sp. (JPV); Samos, 11/09/1994, 1♀ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 1♀ (PAL); Viladiciente (Serrón da Pedra da Hedra), 13/06/2006, 1♂ sobre *Rubus* sp. (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♀ (JPV); Casaio, 24/07/1994, 1♂ (JPV); Encoro de San Martiño, 11/07/1993, 1♀ (JPV); Santa Ana (A Limia), 11/05/1997, 2♂♂ y 1♀ (JPV); Verín, 15/07/1999, 1♂ (J.P. Arias leg.); Vilar de Silva, 7/07/1996, 1♀ (JPV); 17/05/2000, 1♀ (JPV).

Pontevedra: Donón (Cangas do Morrazo), 5/12/1993, 1♀ (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 5/12/1993, 1♀ (FPP); 23/02/2026, 1♂ (FPP); O Santo (Sanxenxo), 20/04/2026, 2 ej. vareando vegetación (FPP); Paredes (A Caniza), 15/06/1996, 1♀ (JPV); Praia de Barra, 24/10/1993, 1♀ sobre un pino joven (JPV); San Vicente do Grove, 17/05/1993, 1♀ (S. Devesa leg.); Vigo, 20/03/1994, 1♀ (JPV).

Especie de distribución euromediterránea y asiática (Ribes & Pagola, 2013). Citada en gran parte de la Península (Oliveira, 1896; Wagner, 1955; Fuente, 1975; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

Citas nuevas para las provincias de A Coruña y Ourense.

Tribu Sciocorini Amyot & Serville, 1843

Dyrodereis umbraculatus (Fabricius, 1775)

Citas previas: A Coruña: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Lugo: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Pontevedra: A Lanzada, O Grove (Bator, 1957).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano, barrio de Cidade Xardín), 20/04/2016, 1♀ en un macizo ruderal (JPV); Cecebre, 29/06/2025, 1♀ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 16/05/2017, 1♂ y 3♀♀ (AO) (MHNUSC); Babela (Monforte de Lemos), 7/08/2001, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 18/05/1999, 1♀ (JPV); 20/05/1999, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 21/05/2003, 1♂ (JPV); 6/06/2006, 1♀ (JPV); Seoane (Monforte de Lemos), 31/05/2006, 1♂ (JPV); Vilaescura (Sober), 26/04/2000, 1♀ (JPV).

Ourense: Os Peares, 31/05/2004, 1♂ (FPP).

Pontevedra: Nanín (Sanxenxo), 15/05/2006, 2♂♂ y 1♀ (FPP); Vigo, 22/04/1993, 1♀ (JPV); 18/03/1997, 1♂ (JPV); 1/07/1997, 1♀ (JPV).

Especie de distribución holomediterránea y pónica (Derjanschi & Péricart, 2005). Presente en casi toda la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017)

Cita nueva para la provincia de Ourense y primeras localidades concretas de A Coruña y Lugo.

***Menaccarus (Oploscelis) arenicola* (Scholtz, 1847)**

Citas previas: Pontevedra: sin localidad precisa (Español, 1956); arenas del Miño³ (Gómez Menor, 1956; Fuente, 1972b).

Material estudiado:

Pontevedra: As Eiras, 17/04/1994, 1♀ en terreno arenoso a la orilla del río Miño (JPV).

Elemento holomediterráneo (Derjanschi & Péricart, 2005). Citada de forma dispersa en gran parte del territorio peninsular (Fuente, 1972b; Ribes & Saulea, 1979; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel *et al.*, 2017).

Primera cita gallega concreta, en la provincia de Pontevedra.

Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851*Material estudiado:**

Lugo: Chao do Fabeiro (Monforte de Lemos), 1/08/2006, 1♀ (JPV); Outeiriño (Monforte de Lemos), 24/05/2006, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 21/05/2003, 1♂ (JPV).

Especie de la Europa media y meridional, extendiéndose a Rusia meridional, Ucrania, Cáucaso y Anatolia (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península, con citas dispersas (Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005).

Primeras citas para Galicia de una especie que amplía así su distribución al del noroeste ibérico.

Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis* Wollaston, 1858*Material estudiado:**

Pontevedra: Nanín (Sanxenxo), 15/05/2006, 1♂; 07/2021, 1♂. Ambos ejemplares sobre una pared (FPP).

Elemento mediterráneo occidental (Derjanschi & Péricart, 2005). En la Península Ibérica citado de forma reciente y de escasas localidades de las provincias de Barcelona y Girona (Roca-Cusachs & Goula, 2017b). Dada la dificultad de determinación de la especie, sólo identificable con seguridad con el estudio del pigóforo, es posible que haya pasado desapercibida confundida con la especie cercana *S. maculatus* Fieber, 1851 (Roca-Cusachs & Goula, 2017b) y, por tanto, su distribución peninsular sea más amplia.

Primeras citas para Galicia, extendiendo de forma notable su área de distribución peninsular.

Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans* (Fabricius, 1794)*Material estudiado:**

A Coruña: San Pedro de Leixa (Ferrol), 9/05/2014, 1♀ (JPV); 18/06/2015, 1♀ (JPV).

Lugo: Lugo (casco urbano), 19/05/2006, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 21/05/2003, 1♂ (JPV).

Ourense: Pozo do Lago (Maside), 9/07/1999, 1♂ (LGP).

Pontevedra: Pontecaldelas, 16/07/1995, 1♀ (JPV).

³ Es muy posible que Fuente (1972b) haya ubicado erróneamente en Ourense la localidad de captura, pues previamente ha sido citada de la misma manera imprecisa por Gómez-Menor (1956), que la sitúa en la provincia de Pontevedra. Gómez Menor indica en su trabajo que los ejemplares le fueron remitidos para estudio por el Padre Laínz, pero no aporta más datos, mientras que Fuente especifica datos del ejemplar aunque no legatario: "Ourense: Arenales del Miño, 1♀, VII de 1949". Es posible que se trate del mismo ejemplar, pero damos más verosimilitud a su hallazgo en el tramo bajo del río Miño en Pontevedra, ya que el recientemente fallecido Padre Manuel Laínz Gallo, sacerdote jesuita y eminente botánico, además de proporcionar datos concretos de localidades cercanas, visitó la misma congregación jesuita de Camposancos por la que han pasado otros conocidos entomólogos como el Padre Franganillo, el Padre Tavares o el Padre Navás, para estudiar durante las vacaciones de su Magisterio parte de la obra botánica del Padre Merino sobre el terreno (Carlón Ruiz, 2014).

Elemento eurosiberiano (Derjanschi & Péricart, 2005). Ampliamente distribuido en la Península aunque con citas dispersas (Oliveira, 1896; Wagner, 1955; Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004).

Primeras citas para Galicia.

***Sciocoris (Sciocoris) galiberti* Ribaut, 1926**

Citas previas: Lugo: Parada do Courel (Ribes, 1986).

Según Derjanschi & Péricart (2005), especie muy próxima a *S. cursitans* y limitada al sudoeste de Francia. Dichos autores señalan, además, que no sólo las citas previas no francesas son dudosas, sino que tampoco está claro que se trate de una especie diferente de *S. cursitans* y sus caracteres diferenciales se deban a simplemente a variabilidad morfológica intraespecífica.

No hemos visto material gallego con caracteres morfológicos concordantes con esta especie.

***Sciocoris (Sciocoris) helferii* Fieber, 1851**

Citas previas: A Coruña: Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879).

Elemento de distribución circunmediterránea, extendido en España especialmente en las zonas de influencia mediterránea y con distribución mal conocida en Portugal (Derjanschi & Péricart, 2005). No obstante, en lo referente a Portugal, existen citas antiguas de varios distritos (Oliveira, 1896; Seabra, 1926, 1939), aunque no posteriores. Parece faltar en el noroeste, de donde sólo conocemos la antigua cita de Bolívar & Chicote (1879) antes mencionada.

No hemos visto material gallego de esta especie.

***Sciocoris (Sciocoris) sulcatus* Fieber, 1851**

Material estudiado:

Lugo: Ribasaltas (Monforte de Lemos), 21/05/2003, 1♀ (JPV); 10/05/2006, 1♂ (JPV); 6/06/2006, 2♀♀ (JPV).

Elemento mediterráneo y pónico (Derjanschi & Péricart, 2005). De la Península Ibérica conocíamos citas dispersas por toda su geografía excepto de la cornisa cantábrica y Galicia, estando registrada de prácticamente todo Portugal, de donde proceden las citas más cercanas a nuestra comunidad (Seabra, 1926, 1939; Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Derjanschi & Péricart, 2005).

Especie nueva para Galicia.

Tribu Strachiini Mulsant & Rey, 1866⁴

***Eurydema (Eurydema) herbacea* (Herrich-Schaeffer, 1833)**

Eurydema cognatum (Fieber, 1864)

Citas previas: A Coruña: sin localidad precisa (Fuente, 1972b), Fisterra (Heiss *et al.*, 2025). Lugo: Viveiro (Fuente, 1972b). Pontevedra: sin localidad precisa (Español, 1956; Derjanschi & Péricart, 2005); Praia de Barra (Eiroa, 1982); O Grove (Remane & Kammerschen, 1991a); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003).

Material estudiado:

A Coruña: Praia de Area Maior (Louro), 21/06/1998, 1♂ (JPV); 25/08/2001, 1♀ (JPV); 27/08/2001, 2♀♀ (JPV); 25/08/2002, 3♂♂ y 2♀♀ en las dunas (JPV); 20/08/2017, 2♂♂ y 1 ninfa (JPV); Praia de

⁴ Dentro de la tribu Strachiini, sólo se han citado de Galicia cinco especies, todas pertenecientes al género *Eurydema* Laporte, 1833. De ellas, *Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus* (Scopoli, 1763), citada de O Barco de Valdeorras por Chapman & Champion (1907), fue considerada ausente de la Península Ibérica hasta Derjanschi & Péricart (2005). A pesar de ser un enclave geográficamente fuera del ámbito ibérico, la cita de la Vall d'Aran (Lleida) (Ribes *et al.*, 2008) permite incluirla en el elenco de especies españolas. Por todo ello, consideramos errónea la cita de Chapman & Champion (1907) y excluimos esta especie del catálogo gallego, a la espera de que nuevas capturas confirmen su presencia en territorio gallego.

Baldaio, 1/05/1982, 1♂ (JPV); 28/06/1987, 1♀ (JPV); Praia de Carnota, 3/05/1997, 1♂ y 3♀♀, sobre *Ammophila* sp., una pareja en cópula (JPV); 31/05/1997, 2♀♀ (JPV); 27/08/2001, 4♀♀ (JPV); Praia de Corrubedo, 30/09/1982, 1♀ (JPV); Praia de Morouzos (Ortigueira), 28/08/2001, 3♀♀ (JPV); 20/07/2007, numerosos ejemplares sobre *Cakile maritima* Scop., muchos en cópula, junto con ninfas en varios estadios, en la parte alta de la playa, justo antes del límite con las dunas (JPV); Praia de Ponteceso, 23/05/1999, 2♀♀ (JPV); Praia de Vilarrube, 17/07/1993, 4♂♂ y 6♀♀ (JPV); Traba, Laxe, 12/05/1991, 1♀ (JPV).

Lugo: Praia de Esteiro (O Barqueiro), 16/08/1996, 2♂♂ (JPV).

Pontevedra: Praia de Pragueira (Sanxenxo), 25/07/2013, 1♂, 1♀ y 1 ninfa (JPV).

Elemento atlántico, conocido de Madeira, isla de Jersey, costas de Francia y de la Península Ibérica (Fuente, 1972b; Derjanschi & Péricart, 2005).

Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758)

Citas previas: Pontevedra: Praia de Barra (Eiroa, 1982).

Material estudiado:

A Coruña: Aranga, 16/05/1982, 1♂ (JPV); Lagoa de Louro, 21/06/1998, 1♂ (JPV).

Lugo: A Cortevella (Serra do Miradoiro), 24/04/2003, 1♀ (JPV); 1/06/2003, 1♀ (JPV); A Fonsagrada, 5/06/2016, 1♂ y 2♀♀ (AO) (MHNUSC); 9/05/2017, 3♂♂ y 2♀♀ (AO) (MHNUSC); Alence, 900 m (Serra do Rañadoiro), 18/08/2005, 1♂ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 29/07/1996, 2♂♂ y 1♀ (PAL); Begonte, 09/05/1993, 1♀ (JPV); Doiras (Serra dos Ancares), 27/06/1993, 1♂ (JPV); Ferrería de Incio, 16/06/1999, 1♂ (FPP & JPV); Liber (Becerreá), 23/07/1994, 1♂ y 2♀♀ (JPV); Monforte de Lemos, 15/08/1986, 1♀ (JPV); 28/05/1987, 1♂ y 1♀ (JPV); 7/05/1999, 4 ejs. (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 2♂♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 10/05/2006, 3♂♂ y 2♀♀ (JPV); 6/06/2006, 1 ej. (FPP & JPV); Rubián, 10/05/2006, 1 ej. (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 1♂ (PAL); Vilarello, 1100 m (Serra dos Ancares), 30/08/1994, 1♂ (JPV); Zanfoga, 4/09/1993, 1♂ (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♂ y 1♀ (JPV); Cabeza Grande de Manzaneda, 1425 m, 12/08/1999, 1♂ y 7♀♀ (LGP); Casaio, 24/07/1994, 4 ejs. (JPV); Laza, 6/04/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); Oulego, 17/04/2001, 3♂ 3♀ (JPV); Valborrás (Carballeda de Valdeorras), 15/07/1998, 1♂ (PAL).

Pontevedra: Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♂ (FPP); O Santo (Sanxenxo), 1♀ (FPP); Simes (Meaño), 26/04/2006, 1♂ (FPP).

Elemento eurosiberiano (Derjanschi & Péricart, 2005). Presente en casi toda la Península (Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Valcárcel *et al.*, 2017). Según Derjanschi & Péricart (2005), en Portugal se encuentra sobre todo en zonas montañosas de la mitad norte, mientras que no parece conocerse de la mitad sur.

Primeras citas para las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense.

Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758)

Citas previas: **A Coruña:** A Coruña (González de Andrés, 1928); As Pontes (González de Andrés, 1934); A Escravitude, Riobós-Cabana (Urquijo, 1935). **Lugo:** Lán cara (Urquijo, 1935). **Pontevedra:** A Guarda (Gómez Menor, 1956).

Material estudiado:

Lugo: Monforte de Lemos, 15/06/2000, 1♀ (JPV); 15/10/2000, 2♂♂ (JPV); Monforte de Lemos (casco urbano), 27/05/2008, 1♂ (JPV); Montefurado, 7/09/1993, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 10/05/2006, 1 ej. (JPV); 6/06/2006, 1♂ (FPP & JPV); Sarria, 20/06/1992, 1♀ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 1♀ (PAL).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♂ (JPV); Casaio, 24/07/1994, 1♂ y 3♀♀ (JPV); Pena Trevinca, 19/06/1994, 1♂ y 1♀ (S. Devesa leg.); 14/07/1998, 1♀ (PAL); Portela do Trigal,

14/07/1998, 1♀ (LGP); Verín, 10/08/1984, 1♂ y 1♀ (JPV); Viladequinta (Carballada de Valdeorras), 24/07/1994, 2♀♀ (JPV); Vilar de Silva, 15/06/2019, 1♀ (AO) (MHNUSC).

Pontevedra: A Ramallosa, 30/04/1995, 1♀ (PAL); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♀ (FPP).

Elemento transpaleártico (Derjanschi & Péricart, 2005). Presente en casi toda la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Valcárcel *et al.*, 2017).

Cita nueva para la provincia de Ourense.

***Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis* Kolenati, 1846**

Material estudiado:

Lugo: A Fonsagrada, 1/07/2017, 1♀ (AO) (MHNUSC); Barcia (Navia de Suarna), 1/06/1995, 1♀ (PAL); 29/07/1996, 1♂ (PAL); Monforte de Lemos, 26/10/1986, 1♂ (JPV); 15/10/1999, 1♀ (JPV); 15/06/2000, 1♀ (JPV); Piñeira (Monforte de Lemos), 22/08/1983, 1♀ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 11/07/2002, 1♂ y 1♀ (JPV); 13/08/2017, 1♂ (JPV); Sarria, 20/06/1992, 1♂ (JPV).

Ourense: Pena Trevinca, 19/06/1994, 1♀ (S. Devesa leg.); Pozo do Lago (Maside), 9/07/1999, 1♂ y 2♀♀ (LGP); Verín, 25/07/1983, 1♂ (JPV).

Pontevedra: A Ramallosa, 30/04/1995, 1♂ (PAL); Nantes (Sanxenxo), 25/07/2006, 1♂ (FPP); O Santo (Sanxenxo), 11/07/1996, 2♂♂ y 2♀♀ (FPP).

Europa media y meridional y región póntica; ausente o rara en África del Norte y Europa atlántica (Derjanschi & Péricart, 2005). Presente en casi toda la Península (Fuente, 1972b; Ribes *et al.*, 2004; Derjanschi & Péricart, 2005; Valcárcel & Prieto, 2006; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2010; Valcárcel *et al.*, 2017).

Especie nueva para Galicia.

Subfamilia Podopinae Amyot & Serville, 1843

Tribu Graphosomatini Mulsant & Rey, 1865

***Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1790)**

Citas previas: **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: Montefurado, 7/09/1993, 2♀♀ (JPV).

Ourense: Viladequinta (Carballada de Valdeorras), 4/07/1994, 1♀ (JPV).

Especie distribuida en toda la región circunmediterránea y del Mar Negro, extendiéndose hacia el Cáucaso, Transcaucasia, Irán y Asia Menor (Péricart, 2010). Común en la Península Ibérica (Oliveira, 1896; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Péricart, 2010; Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Primeras localidades concretas para Galicia, donde parece ser rara y localizada.

***Graphosoma (Graphosoma) lineatum* (Linnaeus, 1758)⁵**

Citas previas: **A Coruña:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Andrés Ares, 2020).

Lugo: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a); Serra do Courel (Alonso Díaz *et al.*, 2019; Castro-Ferreiro & Alonso-Díaz, 2023). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Pontevedra: Tui (Seabra, 1930); sin localidad precisa (Español, 1956); Praia de Barra (Eiroa, 1982).

⁵ Existe una confusión permanente en la literatura acerca de la validez y el estatus de *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766) y *G. lineatum*. En el presente trabajo adoptamos la interpretación de Rider (2006), seguida también por Roca-Cusachs *et al.* (2018). Según dicha interpretación *G. lineatum* sería un elemento transpaleártico (Péricart, 2010).

Material estudiado:

A Coruña: A Coruña (casco urbano, barrio de Eirís), 20/06/2017, varios ejs. en cópula sobre *Foeniculum vulgare* (JPV); A Coruña (casco urbano, barrio del Ensanche), 23/08/2019, 1 ej. en una acera (JPV); As Xubias de Arriba, 5/06/2023, 1 ej. sobre *Foeniculum vulgare* (JPV); Monte Xalo, 7/06/1987, 1♂ (JPV); Praia de Langosteira (Fisterra), 15/08/1996, 1♀ (JPV).

Lugo: A Fonsagrada, 10/06/2017, 2♀♀ (AO) (MHNUSC); A Vacariza (Monforte de Lemos), 19/05/2008, varios ejs. (JPV); Alto do Couto, 1340 m (Serra do Courel), 30/09/2016, 1♂ (EFV & ARF); Barcia (Navia de Suarna), 19/07/1996, 5♂♂ y 4♀♀ (PAL); Doiras (Serra dos Ancares), 25/06/1995, 1♂ y 1♀ (JPV); 26/06/1996, 1 ej. (JPV); Liber (Becerreá), 23/07/1994, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 9/09/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); 25/07/1993, 2♀♀ (JPV); 5/09/1993, 1♂ (JPV); Montefurado, 7/09/1993, 1♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 31/05/2006, 1 ej. (JPV); O Mato (Chao do Fabeiro), 1/08/2006, varios ejs. sobre diversas umbelíferas (JPV); Outeiriño (Monforte de Lemos), 24/05/2006, 1 ej. (JPV); Pedreda, 7/05/1995, 1♀ (PAL); Piño (Monforte de Lemos), 9/08/2006, varios ejs. sobre *Foeniculum vulgare* y diversas umbelíferas (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 6/06/2006, 1 ej. (FPP & JPV); Seoane (Monforte de Lemos), 31/05/2006, varios ejemplares sobre *Daucus* sp. y *Conium maculatum* (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 2♂♂ (PAL); Serrón da Pedra da Hedra, 838 m, 13/06/2006, 1 ej. sobre *Foeniculum* sp. (JPV); Viladiciente (Serrón da Pedra da Hedra), 13/06/2006, 1 ej. (JPV); Xullán (Bóveda), 27/07/2006, 1 ej. (JPV).

Ourense: A Veiga de Cascallá, 24/07/1994, 1♂ (JPV); Fonte da Cova (Pena Trevinca), 14/07/1998, 1♂ y 1♀ (LGP); Os Peares, 27/05/2004, 1♂ (FPP); Pena Trevinca, 19/06/1994, 1♀ (S. Devesa leg.); Portela do Trigo, 28/06/1997, 3♂♂ y 1♀ (JPV); Sas de Penelas, 14/05/1998, 1♂ (JPV); Valencia do Sil, 18/09/1985, 1♀ (JPV); Verín, 15/08/1998, 6♂♂ y 5♀♀ (J.P. Arias leg.); 15/07/1999, 2♂♂ (J.P. Arias leg.); 15/07/2002, 1♂ (J.P. Arias leg.).

Pontevedra: A Ramallosa, 25/08/1995, 1♀ y 2 ninfas (PAL); 17/08/1995, 4 ejs. (PAL); 28/07/1996, 1♂ (PAL); A Serpe (Poio), 24/05/2025, varios ejemplares no recogidos (FPP); Agolada, 25/06/1995, 2♂♂ (JPV); Bordóns (Sanxenxo), 21/07/2025, varios ejemplares no recogidos (FPP); Caldas de Reis, 23/07/1995, 1 ej. (JPV); Cuntumil (Sanxenxo), 5/07/2025, varios ejemplares no recogidos (FPP); Donón (Cangas do Morrazo), 6/05/1996, 1♀ (JPV); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 1♂ y 2♀♀ (FPP); Mondariz-Balneario, 7/08/1993, 1♂ y 1♀ (JPV); 16/08/1993, 2♂♂ (JPV); Paredes (A Caniza), 1/06/1996, 1♀ (JPV); Praia da Lanzada, 13/11/1994, 1 ej. (JPV); Vichocuntín (Cerdedo-Cotobade), 28/05/2026, varios ejemplares no recogidos (FPP).

Muy común en casi toda la Península Ibérica (Oliveira, 1896; Ribes *et al.*, 2004; Grosso-Silva & Soares-Vieira, 2009a; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

Primeras localidades concretas para *A Coruña* y *Ourense*. Probablemente el pentatómido más abundante y extendido en Galicia, donde es casi ubicuo. La escasez de capturas es seguramente debida a ser considerada una especie banal.

Tribu Podopini Amyot & Serville, 1843***Podops (Petalodera) dilatatus* Puton, 1873**

Citas previas: **A Coruña:** Santiago (Bolívar & Chicote, 1879). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); O Grove (Bator, 1957).

Material estudiado:

A Coruña: Vite (Santiago de Compostela), 21/05/1998, 1♀ (LGP).

Lugo: Graveiras de Cadórniga (Monforte de Lemos), 8/06/2005, 1♀ (JPV); Moreda (Monforte de Lemos), 31/05/2006, 1♀ (JPV); Serra da Vacariza, 29/09/2004, 1♂ (JPV).

Especie conocida sólo de España, Italia y Portugal (Ribes *et al.*, 2004; Péricart, 2010), con citas ibéricas escasas y dispersas (Grosso-Silva, 2005; Péricart, 2010; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas para la provincia de Lugo.

***Podops (Podops) inunctus* (Fabricius, 1775)**

Citas previas: **A Coruña:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie de distribución europea (Péricart, 2010). En la Península, aunque esporádica y registrada de forma mayoritaria en el tercio septentrional (Ribes *et al.*, 2004; Roca-Cusachs & Goula, 2017a), también conocemos algunas citas antiguas de Andalucía (Rosenhauer, 1856) y Murcia (Lethierry, 1886)

No hemos visto material gallego de esta especie.

Familia SCUTELLERIDAE Leach, 1815

Subfamilia Eurygastrinae Amyot & Serville, 1843

Tribu Eurygastrini Amyot & Serville, 1843

***Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776)**

Citas previas: **Lugo:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: Monforte de Lemos (casco urbano), 15/10/2001, 1♀ (JPV); Rubián, 10/05/2006, 2♂♂ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Göllner-Scheiding, 2006). Presente en casi toda la Península (Pissarro, 1953; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas concretas para Galicia, en la provincia de Lugo.

***Eurygaster hottentotta* (Fabricius, 1775)**

Citas previas: **Ourense:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie de distribución centroeuropea y circummediterránea (Göllner-Scheiding, 2006). Citada de forma dispersa en la Península Ibérica, más frecuente en la mitad meridional (Oliveira, 1896; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017).

No hemos visto material gallego de esta especie.

***Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: **A Coruña:** sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). **Lugo:** sin localidad precisa (Urquijo Landaluze, 1937; Cañizo, 1941; Roca-Cusachs & Goula, 2017a); Serra do Courel (Alonso Díaz *et al.*, 2019). **Pontevedra:** Tui (Seabra, 1930); sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: Betanzos, 2/08/1996, 2♀♀ (JPV).

Lugo: A Vacariza (Monforte de Lemos), 27/07/1999, 1♂ (JPV); Barcia (Navia de Suarna), 17/07/1996, 1♀ (PAL); 29/07/1996, 2♀♀ (PAL); Ferrería de Incio, 4/09/1994, 1♀ (JPV); Formigueiros (Serra do Courel), 15/10/1998, 1♀ (FPP & JPV); Lugo, 14/05/1995, 1♀ (PAL); Monforte de Lemos, 28/05/198, 1♀ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/199, 1♂ (PAL).

Ourense: Portela do Trigal, 14/07/1998, 1♀ (LGP); Serra do Invernadoiro, 1/07/1997, 1♀ (JPV).

Pontevedra: A Ramallosa, 28/07/1996, 1♂ (PAL); Dorrón (Sanxenxo), 10/05/2006, 5♀♀ (FPP).

Elemento paleártico (Göllner-Scheiding, 2006). Presente en casi toda la Península (Oliveira, 1896; Wagner, 1955; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas para la provincia de Ourense y primeras citas concretas para la de A Coruña.

Eurygaster testudinaria testudinaria (Geoffroy, 1785)

Citas previas: Ourense: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Pontevedra: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

A Coruña: Parque do Casino (A Zapateira), 24/04/2025, 1♀ (JPV); Silvosa, 28/08/2002, 1♂ (JPV).

Lugo: Becerreá, 24/07/1999, 1♀ (JPV); Escádebas (Guitiriz), 6/06/1993, 1♀ (JPV); Ferrería de Incio, 4/09/1994, 1♀ (JPV); Fraga de Carballido (A Fonsagrada), 31/07/2003, 1♀ (JPV); Fraga de Seixosmil (Serra de Meira), 27/07/2004, 1♀ (JPV); Navia de Suarna, 13/07/2001, 2♀♀ y 1 ninfa (JPV); Pena do Pico, 1124 m (Becerreá), 21/09/2005, 1♂ (JPV); Ribasaltas (Monforte de Lemos), 6/06/2006, 1♀ (JPV); Vilarello, 1100 m (Serra dos Ancares), 23/07/1994, 1♂ y 1♀ (JPV); 25/06/2004, 1♂ y 1♀ (JPV).

Ourense: Portela do Trigo, 14/07/1998, 1♂ (LGP).

Pontevedra: Aciveiro, 16/05/2006, 3♂♂ (FPP); Pontecaldelas, 16/07/1995, 1♂ y 1♀ (JPV); Simes (Meaño), 26/04/2006, 1♀ (FPP).

Distribución paleártica (Göllner-Scheiding, 2006). Presente con citas dispersas en gran parte de la Península Ibérica (Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel & Prieto, 2006; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas para las provincias de A Coruña y Lugo y primeras localidades concretas para las de Ourense y Pontevedra.

Tribu Psacastini Mulsant & Rey, 1865

Psacasta (Cryptodontus) tuberculata (Fabricius, 1781)

Citas previas: Pontevedra: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Especie de distribución europea y circunmediterránea (Göllner-Scheiding, 2006). Presente en gran parte de la Península (Seabra, 1924; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Valcárcel *et al.*, 2017; Gil & Grosso-Silva, 2023).

No hemos visto material gallego de esta especie.

Psacasta (Psacasta) exanthematica exanthematica (Scopoli, 1763)

Citas previas: Ourense: sin localidad precisa (Roca-Cusachs & Goula, 2017a).

Material estudiado:

Lugo: Piñeira (Monforte de Lemos), 22/08/1993, 1♀ (JPV); Seoane do Courel, 10/08/1996, 1♂ y 1♀ (PAL).

Pontevedra: Cabo Home, 27/04/1996, 1♀ (JPV).

Elemento paleártico occidental (Göllner-Scheiding, 2006). Presente en casi toda la Península (Oliveira, 1896; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Roca-Cusachs & Goula, 2017a; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Primeras citas concretas para Galicia, de las provincias de Lugo y Pontevedra.

Psacasta (Psacasta) granulata (A. Costa, 1847)

Material estudiado:

Lugo: Piñeira (Monforte de Lemos), 22/08/1993, 1♂ (JPV).

Especie de distribución circunmediterránea y presente en Asia Menor (Göllner-Scheiding, 2006). De la Península Ibérica conocemos únicamente las citas previas de las provincias de Valladolid (Carapezza & Kerzhner, 2005) y Cuenca (Roca-Cusachs & Goula, 2017a). Existe una considerable confusión en torno a esta especie debido a la sinonimia entre *Psacasta conspersa* Puton, 1881 (*non* Germar, 1839) y *Psacasta granulata* (A. Costa, 1847). *Psacasta exanthematica conspersa* Germar, 1839 es una subespecie de distribución europea oriental y asiática no presente en la Península ibérica (Göllner-Scheiding, 2006). Existen sin embargo numerosas citas de *Psacasta conspersa* Germar, 1839 distribuidas por gran parte del territorio peninsular (véase Fuente, 1973, entre otros), que podrían corresponder tanto a *P. exanthematica* como a *P. granulata*, por lo que la distribución peninsular de *P. granulata* está por definir.

Especie nueva para Galicia.

Subfamilia Odontoscelinae Amyot & Serville, 1843

La subfamilia Odontoscelinae está representada en Galicia únicamente por el género *Odontoscelis* Laporte de Castelnau, 1832. Debido a su complejidad taxonómica, se requiere el estudio del pigóforo y de las piezas internas de la genitalia masculina para un diagnóstico fiable. Por ello, todas las citas ibéricas anteriores a la revisión de Göllner-Scheiding (1987), y seguramente algunas de las posteriores que no hayan tenido en cuenta dicha revisión, deben considerarse con la debida cautela.

Odontoscelis (Odontoscelis) dorsalis (Fabricius, 1798)

Citas previas: A **Coruña:** Ferrol (Bolívar & Chicote, 1879). **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956).

Según Göllner-Scheiding (2006), especie de distribución norteafricana y asiática, con extensión a África tropical y no presente en Europa. Hasta una revisión en profundidad, al menos en lo referente a la Península Ibérica, las citas ibéricas deben considerarse como dudosas y probablemente referidas a alguna de las especies siguientes.

Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa (Linnaeus, 1761)

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); Praia de Barra (Eiroa, 1982).

Especie paleártica (Göllner-Scheiding, 2006). En la Península Ibérica, citada de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004).

No hemos visto material gallego de esta especie.

Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica Göllner-Scheiding, 1987⁶

Material estudiado: **Pontevedra:** Praia de Camposancos, 1/05/1997, 1♂ y 3♀♀ (JPV); San Vicente do Grove, 18/06/1993, 1♂ (S. Devesa leg.).

Endemismo ibérico, con citas escasas y distribución precisa por establecer (Ribes *et al.*, 2004; Göllner-Scheiding, 2006), con citas recientes de Andalucía y Cataluña (Valcárcel *et al.*, 2017; Heiss *et al.*, 2023).

Especie nueva para Galicia.

⁶ Göllner-Scheiding (1986), en su revisión del género *Odontoscelis* (lo que se comenta también *in extenso* en Ribes, 1988), separa cinco especies del grupo *fuliginosa*: dos de ellas, *O. fuliginosa* (Linnaeus, 1761) y *O. iberica* Kolenati, 1846, presentes en la Península Ibérica. En una nota posterior (Göllner-Scheiding, 1987) señala, sin embargo, que *O. iberica* es una sinonimia, ya de *O. fuliginosa*, ya de *Odontoscelis byrrhus* Seidenstucker, 1972, y que los ejemplares estudiados, procedentes de distintas localidades de la Península Ibérica, no corresponden en absoluto a la especie descrita por Kolenati, cuyo material era estrictamente caucásico. El error radicaría en la ambivalencia del adjetivo específico "iberica", referido aquí a una antigua región de Georgia, y al hecho de no haber podido estudiar el tipo, presumiblemente perdido; por lo tanto, al requerir otro nombre la nueva forma específicamente distinta de *O. fuliginosa* la autora la denomina *O. hispanica* nom. nov. (Göllner-Scheiding, 1987; Ribes, 1988; Baena, 2006).

Odontoscelis (Odontoscelis) lineola* Rambur, 1839*Material estudiado:**

A Coruña: Praia de Morouzos (Ortigueira), 11/06/2006, 5♂♂ y 4♀♀ muertos sobre la pasarela de las dunas fijas (JPV).

Ourense: Vilar de Silva, 7/07/1995, 1♀ (FPP & JPV).

Pontevedra: As Eiras, 1/08/2004, 4♂♂ en el filtro de una piscina (FPP); Praia de Camposancos, 1/05/1997, 1♀ (JPV).

Especie de distribución europea con extensión a Asia Menor (Göllner-Scheiding, 2006). En la Península Ibérica, citada de forma dispersa (Oliveira, 1896; Fuente, 1973; Ribes *et al.*, 2004; Gil & Grosso-Silva, 2023).

Especie nueva para Galicia.

Subfamilia Odontotarsinae Mulsant & Rey, 1865**Tribu Odontotarsini Mulsant & Rey, 1865*****Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790)****Material estudiado:**

Ourense: Viladequinta (Carballeda de Valdeorras), 24/07/1994, 4♂♂ y 12♀♀ (JPV).

Especie de distribución paleártica (Göllner-Scheiding, 2006), con citas dispersas en gran parte del territorio peninsular (Pissarro, 1951; Fuente, 1973; Ribes & Sauleda, 1979; Ribes *et al.*, 2004; Valcárcel *et al.*, 2017).

Especie nueva para Galicia.

Familia THYREOCORIDAE Amyot & Serville, 1843**Subfamilia Thyreocorinae Amyot & Serville, 1843*****Thyreocoris fulvipennis* (Dallas, 1851)**

Thyreocoris fulvinervis (Scott, 1870)

Citas previas: **Pontevedra:** sin localidad precisa (Español, 1956); O Grove (Fuente, 1972a).

Especie de distribución europea y norteafricana (Göllner-Scheiding, 2006). En la Península Ibérica, además de las citas gallegas mencionadas, está citado de Andalucía sin precisión (Baena, 2006), Alicante (Ribes & Sauleda, 1979), Madrid (Bolívar & Chicote, 1879; Seabra, 1930b; Fuente, 1972a) y Cataluña (Ribes *et al.*, 2004). En cuanto a su presencia en Portugal, Seabra (1925) afirma que las citas de Oliveira (1896) como *Corimelaena scarabaeoides* L. pertenecen en realidad a *T. fulvipennis*.

No hemos visto material gallego de esta especie.

Conclusiones

En el presente trabajo se recogen datos faunísticos de las 75 especies de Pentatomoidea registradas en la Comunidad Autónoma de Galicia que hemos podido considerar como válidas, pertenecientes a las familias Cydnidae (18 sp.), Pentatomidae (excluyendo Asopinae) (44 especies), Scutelleridae (12 especies) y Thyreocoridae (1 especie).

No se ha podido constatar la presencia de la familia Plataspidae en territorio gallego, ni mediante citas bibliográficas ni a partir del estudio de material inédito.

Se citan de Galicia por primera vez 19 especies:

- Cydnidae (8 especies): *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794), *Adomerus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852), *Legnotus fumigatus* (A. Costa, 1853), *Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785), *Legnotus picipes* (Fallén, 1807), *Ochetostethus pygmaeus* (Rambur, 1839), *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866 y *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839).
- Pentatomidae (7 especies): *Holcostethus (Holcostethus) albipes* (Fabricius, 1781), *Staria lunata* (Hahn, 1835), *Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851, *Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis* Wollaston, 1858, *Sciocoris (Sciocoris) cursitans* (Fabricius, 1794), *Sciocoris (Sciocoris) sulcatus* Fieber, 1851 y *Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis* Kolenati, 1846.
- Scutelleridae (4 especies): *Psacasta (Psacasta) granulata* (A. Costa, 1847), *Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica* Göllner-Scheiding, 1987, *Odontoscelis (Odontoscelis) lineola* Rambur, 1839 y *Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790).

De entre ellas, cabe destacar por ser especies escasamente citadas en la Península Ibérica o por ampliar de forma notable su área de distribución conocida las especies *Microporus nigrita*, *Holcostethus albipes*, *Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus*, *Sciocoris sideritidis*, *Psacasta granulata* y *Odontoscelis hispanica*.

Se aportan además las primeras localidades concretas para Galicia de *Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1790) y *Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776), así como 64 registros provinciales nuevos (véase Tabla 2).

Por último deben excluirse del catálogo de especies gallegas algunas que, como se menciona en el texto, fueron citadas erróneamente: *Tritomegas rotundipennis*, *Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus* y *Palomena viridissima*. Otras especies se han considerados dudosas y pendientes de confirmación.

En la Tabla 1 se hace una comparación del número de especies de las familias que se tratan en este trabajo registradas en la Península Ibérica y Galicia, respectivamente. Es evidente que, a pesar del trabajo realizado por los autores a lo largo de estos años y de la colaboración desinteresada que han tenido por parte de muchos colegas, el esfuerzo de muestreo dista de ser satisfactorio, máxime debido a la escasez y dispersión de las poblaciones de muchas de las especies estudiadas y a la extensión del territorio gallego.

Conjuntamente con los Acanthosomatidae y Asopinae (Pentatomidae), estudiados en Valcárcel & Prieto (2014), esta entrega completa una primera aproximación de conjunto al estudio faunístico de los Pentatomoidea de Galicia. Queda sin embargo mucho trabajo por hacer en este campo, pues se hace muy necesaria una actualización de las familias Cydnidae y Scutelleridae de la fauna europea y, por ende, ibérica, familias con géneros de taxonomía compleja y en algunos casos pendientes de revisión. Como se ha mencionado en la introducción, dichas revisiones o actualizaciones muy probablemente modificarán, tal vez de forma sustancial, la información presentada en este trabajo. Al menos en lo que respecta al ámbito de Galicia, los autores esperamos haber puesto los rudimentos para que otros colegas en el futuro continúen haciendo aportaciones y avanzando en el estudio de este interesante grupo.

Tabla 1. - Comparativa del número de especies de las familias estudiadas catalogadas en la Península Ibérica y Galicia.

	Península Ibérica (Roca-Cusachs et al., 2018b; Gapon, 2018)	Galicia
Cydnidae	49	18
Pentatomidae (excepto Asopinae)	106	44
Plataspidae	1	0
Scutelleridae	23	12
Thyreocoridae	2	1
TOTAL	181	75

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Pedro Álvarez, Luis Babío, Sergio Devesa, Eliseo H. Fernández Vidal, Lorenzo Gómez Prieto, Carlos Mejuto Rial, Alejandro Ocampo, Marta Pérez, Juan Pérez Arias (†), María Luisa Pita, Antonia Rodríguez Fandiño y J. Santamaría, por facilitarnos parte del material utilizado en esta entrega. A Berend Aukema, Manuel Baena, Eliseo H. Fernández-Vidal, Marta Goula, Santiago Pagola-Carte, Mercedes París y David Rider, por su aportación bibliográfica. Muy especialmente a José Manuel Grosso-Silva y Marcos Roca-Cusachs, por sus valiosos consejos.

Bibliografía

Alonso Díaz, J., Castro Ferreiro, J. & Rigueiro Rodríguez, A. 2019. II BioBlitz Ancares-Courel, edición Courel. *Micolucus*, **6**: 73-91.

Andrés Ares, J.L. 2020. Quality Hemiptera ornamental pests in Galicia III: Pentatomidae, Triozidae, Aphrophoridae, Tingidae, Aleyrodidae & Coreidae species identified on woody ornamental crops. *Professional Plant Protection*, **5**(8): 1-8.

Aukema, B. (ed.). 2026. *Catalogue of Palaearctic Heteroptera* [Online database]. Available from: <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/> [Last access: 20-04-2026].

Baena, M. 2006. *Hemipteroides. Fauna Andaluza*, pp. 249-298. En: Tinaut, A. & Pascual, F. (coords.). *Proyecto Andalucía. Naturaleza*. Tomo XVII: Zoología V, capítulo 9. Publicaciones Comunitarias. Sevilla 384 pp.

Bator, A. 1957. Hemipterologisches aus Spanien. *Beiträge zur Entomologie*, **7**(3-4): 297-308.

Bolívar, I. & Chicote, C. 1879. Enumeración de los Hemípteros observados en España y Portugal. *Anales de la Sociedad española de Historia Natural*, **8**: 147-186.

Cañizo, J. del. 1941. Notas sobre el "Sampedrito" del trigo. *Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola*, **10**: 264-274.

Carapezza, A. & Kerzhner, I.M. 2005. Species of the subgenus *Psacasta* s. str. (Heteroptera: Scutelleridae). *Zoosystematica Rossica*, **14**(1): 55-60.

Carral, E., Otero, C., Roca-Fernández, A.I. & Rodríguez, T. 2022. *Avaliación da biota edáfica e entomofauna polinizadora en cultivo de trigo 'Caaveiro' en convencional vs. ecolóxico*, pp. 53-74. En: Romero Rodríguez, M.A. & Pereira Lorenzo, S. (coords.). *Dende a produción á panificación do trigo galego 'Caaveiro' en cultivo ecolóxico vs. convencional*. Monografías do Ibader - Serie Recursos Alimentarios. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo, 137 pp.

Castro-Ferreiro, J. & Alonso-Díaz, J. 2023. III BioBlitz Ancares-Courel, edición Courel. *Micolucus*, **10**: 48-72.

Chapman, T.A. & Champion, G.C. 1907. Entomology in N.W. Spain (Galicia and Leon). *Transactions of the Entomological Society of London*, [**1907**](1): 147-171 + pls. V-XI.

Derjanschi, V. & Péricart, J. 2005. *Hémiptères Pentatomoidea euro-méditerranéens. Volume 1. Généralités, systématique: première partie. Faune de France. France et régions limitrophes*, 90. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. Paris, 494 pp.

- Dioli, P., Leo, P. & Maistrello, L. 2016. Prime segnalazioni in Spagna e in Sardegna della specie aliena *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) e note sulla sua distribuzione in Europa (Hemiptera, Pentatomidae). *Revista gaditana de Entomología*, **8**(1): 539-548.
- Ducamp, P., Romet, N., Dhellemmes, T., Sannier, D., Matocq, A. & Maurel, J.Ph. 2024. Contribution à la connaissance des hétéroptères d'Andalousie (Espagne). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **113**: 237-281.
- Eiroa Álvarez, M.E. 1982. *La entomofauna de las dunas de la playa de Barra (Cangas-Pontevedra). Memoria de Licenciatura (inérita)*. Facultad de Biología, Universidad de Santiago. Santiago, 134 pp.
- Español, F. 1956. Contribución al estudio de los tenebriónidos del noroeste de España (Col. Heterómeros). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada de Barcelona*, **24**: 5-71.
- Fuente, J.A. de la. 1972a. Revisión de los Pentatómidos ibéricos. Familia Cydnidae Billberg, 1820. *Boletín de la Real Sociedad española de Historia Natural. Sección Biológica*, **70**(1-2): 33-78.
- Fuente, J.A. de la. 1972b. Revisión de los pentatómidos ibéricos (Hemiptera). Parte I. Tribus Sciocorini Stal, 1872 y Strachiini Stal, 1872. *Eos*, **47**(1-4) [1971]: 71-135.
- Fuente, J.A. de la. 1973. Revisión de los pentatómidos ibéricos. Familia Scutelleridae Leach, 1815, con adiciones y correcciones a un trabajo anterior. *Boletín de la Real Sociedad española de Historia Natural. Sección Biológica*, **71**(3-4): 235-270.
- Fuente, J.A. de la. 1974. Revisión de los pentatómidos ibéricos (Hemiptera). Parte II. Tribus Aeliini Stal, 1872, Stagonomini n. nom. (=Eysarcorini auct.) y Carpocorini Distant, 1902. *Eos*, **48**(1-4) [1972]: 115-201.
- Fuente, J.A. de la. 1975. Revisión de los pentatómidos ibéricos (Hemiptera). Parte III. Tribu Pentatomini s. str. *Eos*, **49**(1-4) [1973]: 113-129.
- Gapon, D.A. 2018. Morphology of male and female terminalia and taxonomic revision of the burrower bugs genus *Canthophorus* (Heteroptera: Cydnidae), *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, **54**(3): 183-228.
- Gessé, F., Goula, M., Isern-Vallverdú, J. & Pedrocchi-Renault, C. 1995. Heterópteros de los puertos de Aísa y Borau (Pirineo de Huesca): Resultados faunísticos. *Lucas Mallada*, **7**: 193-211.
- Gil, F. & Grosso-Silva, J.M. 2023. Inventário preliminar dos invertebrados de Lousada. *Lucanus - Revista de Ambiente e Sociedade*, **7**: 46-77.
- Göllner-Scheiding, U. 1986. Revision der Gattung *Odontoscelis* Laporte de Castelnau, 1832 (Heteroptera, Scutelleridae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **33**(1-2): 95-127.
- Göllner-Scheiding, U. 1987. Ergänzung und Korrektur zu der Revision der Gattung *Odontoscelis* Laporte de Castelnau, 1832 (Het., Scutelleridae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **34**(1-3): 217-218.
- Göllner-Scheiding, U. 2006. Family Scutelleridae Leach, 1815, pp. 190-227. En: Aukema, B. & Rieger, Ch. (eds.). *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 5. Pentatomomorpha II*. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam, xiii + 550 pp.
- Gómez-Menor, J. 1956. Consultas. *Graellsia*, **14**: 63-71.
- Gómez Orland, V. 1880. *Flora y fauna de la localidad*, pp. 29-40. En: *Monografía de las aguas minero-medicinales de Sierra Alhamilla ó de Almería, termo-carbonatadas cálcico-magnésicas, arreglada de*

cuantos antecedentes, memorias y notas manuscritas existen en el Archivo del establecimiento. Imprenta de D. M. Álvarez y Robles. Almería, 72 pp.

González de Andrés, C. 1928. Reseña de los trabajos de la Estación de Patología Vegetal de La Coruña. *Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola*, **3**: 55-57.

González de Andrés, C. 1934. Insectos perjudiciales a las plantas cultivadas en Galicia. *Las Ciencias (Anales de la Asociación para el Progreso de las Ciencias)*, **1**: 829-837.

González Vicente, M. 1978. Contribución al conocimiento de los Pentatómidos (Hem. Heteroptera) de la provincia de Salamanca. *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **1**: 177-186.

Grosso-Silva, J.M. 2005. Additions to the fauna of Hemiptera and Coleoptera (Insecta) of Serra da Estrela Natural Park (Portugal). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **36**: 185-193.

Grosso-Silva, J.M. & Soares-Vieira, P. 2009a. A preliminary list of the Coleoptera and Hemiptera of the Gaia Biological Park (northern Portugal), with comments on some species. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **44**: 541-544.

Grosso-Silva, J.M. & Soares-Vieira, P. 2009b. Coleoptera and Hemiptera of the Gaia Biological Park (northern Portugal) (2nd note): Additions to the list and new distribution data, with comments on some species. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **45**: 439-441.

Grosso-Silva, J.M. & Soares-Vieira, P. 2010. The insects of the Gaia Biological Park (northern Portugal) (3rd note): Additions and new distribution data (Insecta: Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mecoptera). *Arquivos Entomológicos*, **5**: 3-7.

Günther, C. & Günther, H. 2019. List of bugs collected in Southern Spain (Heteroptera). *Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld*, **129**(4): 223-242.

Heiss, E., Eckelt, A., Lederwasch, M. & Unterasinger, R. 2023. Die Heteropterensammlung Ernst Heiss im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Teil XV: Pentatomomorpha VIII: Familien Scutelleridae, Dinidoridae, Urostylididae, Parastrachiidae. *Linzer biologische Beiträge*, **55**(1): 9-35.

Heiss, E., Eckelt, A., Lederwasch, M. & Unterasinger, R. 2025. The Heteroptera Collection Ernst Heiss at the Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Part XX: Pentatomomorpha: Families Pentatomidae, Phloeidae. *Naturamonta*, **2**: 147-226.

Hernández Pacheco, E. 1895. Datos para la fauna de Extremadura Central. *Actas de la Sociedad española de Historia Natural*, **24**: 62-67.

Kerzhner, I.M. 1976. Heterópteros nuevos y poco conocidos de Mongolia y regiones adyacentes de la URSS (en ruso). *Nasekomye Mongolii*, **4**: 30-86.

Lethierry, L. 1886. Hémiptères récoltés a Aguilas, près Carthagène (Espagne) par M. Weyers. *Comptes-rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique*, [1886]: 50-51.

Lis, J.A. 2006. Family Cydninae Billberg, 1820, pp. 119-147. En: Aukema, B. & Rieger, Ch. (eds.). *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 5. Pentatomomorpha II*. The Netherlands Entomological Society. Amsterdam, xiii + 550 pp.

Lupoli, R. & Dusoulier, F. 2015. *Les punaises Pentatomoidea de France*. Éditions Ancyrosoma. Fontenay-sous-Bois, 429 pp.

- Mainer, A. 1979. Fauna de la alfalfa en Guísamo (La Coruña). *Braña, Boletín Científico da Sociedade Galega de Historia Natural*, **2**: 37-54.
- Mederos-López, J., Nel-lo, M., Brañas, N., Caballero-López, B. & Masó, G. 2014. *Estudi preliminar de la comunitat d'artròpodes de les codines del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac*, pp. 48-59. En: Duran, C., Hernández, J., Grau, J. & Melero, J. (coords.). *VIII Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac*. Documents de Treball, Sèrie Territori, 29. Diputació de Barcelona. Barcelona, 232 pp.
- Medina Ramos, M. 1895. Hemípteros de Andalucía existentes en el Museo de Historia natural de la Universidad de Sevilla, clasificados por D. Ignacio Bolívar. *Actas de la Sociedad española de Historia Natural*, **24**: 67-75.
- Oliveira, M.P. de. 1896. *Catalogue des Hémiptères du Portugal (Heteroptères)*. Imprensa da Universidade. Coimbra, 80 pp.
- Pagola-Carte, S. & Ribes, J. 2007. Registros interesantes de heterópteros (Hemiptera: Heteroptera) en el País Vasco (norte de la Península Ibérica). *Heteropterus Revista de Entomología*, **7**(1): 25-31.
- Péricart, J. 2010. *Hémiptères Pentatomoidea Euro-Méditerranéens, Volume 3: Podopinae et Asopinae*. Faune de France 93. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles. Paris, 290 pp.
- Pissarro, C. 1951. Contribuição para o conhecimento dos Hemípteros do Algarve. *Arquivos do Museo Bocage*, **22**: 111-130.
- Pissarro, C. 1953. Contribuição para o conhecimento dos Hemípteros do Algarve. II. *Arquivos do Museo Bocage*, **24**: 115-122.
- Rambur, P. 1839. *Hémiptères*, pp. 95-212. En: *Faune entomologique de l'Andalousie. Tome II*. Arthus Bertrand. Paris.
- Remane, R. & Kammerschen, D. 1991a. Zur Besiedlung der Mittelatlantischen Inseln (Kanaren, Madeira, Azoren) durch Taxa der Gattung *Eurydema* Lap. (Heteroptera, Pentatomidae). *Marburger Entomologische Publikationen*, **2**(5): 25-57.
- Remane, R. & Kammerschen, D. 1991b. Zur Verbreitung und Artabgrenzung der Taxa der Gattung *Dolycoris* M.R. (Heteroptera, Pentatomidae, Pentatominae) in der südwestpaläarktischen, insbesondere auf den Mittelatlantischen Inseln. *Marburger Entomologische Publikationen*, **2**(5): 58-112.
- Ribes, J. 1974. Hemípteros de la zona de Algeciras (Cádiz). III. *Miscelánea Zoológica*, **3**(4): 11-19.
- Ribes, J. 1982. Hemípteros del norte de Cataluña nuevos o interesantes para la fauna ibérica. *Pirineos*, **117**: 35-47.
- Ribes, J. 1986. Noves dades sobre heteròpters ibèrics. *Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN-SCL*, **4** [1985]: 156-164.
- Ribes, J. 1988. Heterópteros de la zona de Algeciras (Cádiz). V. *Miscel·lània Zoològica*, **12**: 133-145.
- Ribes, J. & Pagola-Carte, S. 2013. *Hémiptères Pentatomoidea Euro-Méditerranéens, Volume 2. Systématique: Deuxième Partie (Sousfamille Pentatominae, suite et fin)*. Faune de France. France et régions limitrophes, Vol. 96. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles. Paris, 423 pp.
- Ribes, J. & Ribes, E. 2000. Noves dades d'hemípters per a Catalunya i territoris limítrofs (Heteroptera). *Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN-SCL*, **10** [1997]: 5-29.

- Ribes, J. & Sauleda, N. 1979. Heterópteros de Alicante y zonas adyacentes. *Mediterránea*, **3**: 123-158.
- Ribes, J. & Schmitz, G. 1992. Révision du genre *Brachynema* Mulsant & Rey, 1852 (Het., Pentatomidae, Pentatominae). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, **128**: 105-166.
- Ribes, J., Blasco-Zumeta, J. & Ribes, E. 1997. *Heteroptera de un sabinar de Juniperus thurifera L. en Los Monegros, Zaragoza*. Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 2. Zaragoza, 127 pp.
- Ribes, J., Gapon, D.A. & Pagola-Carte, S. 2007. On some species of *Carpocoris* Kolenati 1846: new synonymies (Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). *Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv*, **31**: 187-198.
- Ribes, J., Serra, A. & Goula, M. 2004. *Catàleg dels heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Institució Catalana d'Història Natural i Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 128 pp.
- Ribes, J., Goula, M., Pagola-Carte, S., Gessé, F. & Ribes, E. 2008. Addicions i correccions al catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). *Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN-SCL, 13-14 [2003-2007]*: 107-165.
- Rider, D. 2006. *Pentatomidae Leach, 1815*, pp. 233-402. En: Aukema, B. & Rieger, Ch. (eds.). *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 5. Pentatomomorpha II*. The Netherlands Entomological Society. Amsterdam, xiii + 550 pp.
- Roca-Cusachs, M. & Goula, M. 2017a. Photosharing website photographs as a tool to refine distribution of Iberian and Canarian Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **60**: 397-405.
- Roca-Cusachs, M. & Goula, M. 2017b. Confirmation of the presence of *Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis* Wollaston, 1858 (Heteroptera: Pentatomidae) in the Iberian Peninsula and first records for the province of Barcelona. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, **81**: 11-12.
- Roca-Cusachs, M., Fernández, D., Escudero Colomar, L.A. & Goula, M. 2018a. New records of the invasive alien plant pest *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) in the Iberian Peninsula (Heteroptera: Pentatomidae). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, **82**: 73-77.
- Roca-Cusachs, M., Prieto Piloña, F., Valcárcel, J.P. & Goula, M. 2018b. *Checklist de Fauna Ibérica. Superfamilia Pentatomoidea Leach, 1815 (Insecta: Heteroptera) en la península ibérica, islas Baleares e islas Canarias (edición 2018)*. En: Ramos, M.A. & Sánchez Ruiz, M. (eds.). *Documentos Fauna Ibérica*, 4. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid, 2 (sn) + 17 pp.
- Rosenhauer, W.G. 1856. *Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten*. Verlag Theodor Blaesing. Erlangen, 429 pp.
- Ruiz Castro, A. 1943. *Fauna entomológica de la vid en España. Estudio sistemático-biológico de las especies de mayor importancia económica. I*. Instituto Español de Entomología. Madrid, 150 pp.
- Seabra, A.F. 1924. Observações sôbre algumas espécies raras ou pouco conhecidas de Hemípteros Heterópteros de Portugal. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, Série I*, **2**: 5-19.
- Seabra, A.F. de. 1925. Sinópse dos Hemípteros Heterópteros de Portugal (cont.). *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, Série I*, **1(2)**: 49-67.

Seabra, A.F. de. 1926. Sinópse dos Hemípteros Heterópteros de Portugal (cont.). *Memórias e Estudos do Museo Zoológico da Universidade de Coimbra, Série I*, **1**(3): 69-170.

Seabra, A.F. de. 1930a. Aditamentos à Memória sôbre os Hemípteros Heterópteros da Região Paleártica existentes no Museu de Coimbra. 4.º - Heterópteros de Tuy e Salamanca oferecidos ao Museu de Coimbra pelo Prof. Joaquim da Silva Tavares. *Memórias e Estudos do Museo Zoológico da Universidade de Coimbra, série I*, **47**: 1-17.

Seabra, A.F. de. 1930b. Liste de quelques espèces d'Hétéroptères de l'Escorial appartenant au "Deuts. Entomolog. Museum". *Memórias e Estudos do Museo Zoológico da Universidade de Coimbra*, **43**: 1-2.

Seabra, A.F. de. 1939. Contribuição para a História da Entomologia em Portugal. A Secção Entomológica do Laboratório de Biologia Florestal. *Publicações da Direcção Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas*, **6**(1): 1-146.

Tanco, J. 2024. Primeras citas de *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) en Galicia, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana (España). *Archivos Entomológicos*, **30**: 149-152.

Urquijo, P. 1935. *Reseña de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña en 1934*, pp. 293-301. En: VV.AA. 1935. *Plagas del campo. Memorias del Servicio de Fitopatología Agrícola. III. 1934*. Dirección General de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Madrid, 348 pp.

Urquijo, P. 1937. *Nuevos insectos registrados*, pp. 16-21. En: *Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña, Años 1935-1936*. Publicación núm. 12. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia. La Coruña.

Urquijo, P. 1949. *Nuevos insectos registrados*, pp. 38-40. En: *Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña (1945, 1946 y 1947)*. Publicación núm. 43. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia. La Coruña.

Urquijo, P. 1956. *Nuevos insectos registrados*, pp. 26-30. En: *Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña (1948, 1949 y 1950)*. Publicación núm. 53. Instituto de Investigaciones Agronómicas. Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia. La Coruña.

Valcárcel, J.P. 2009. Hibernación de *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera, Pentatomidae) en una caja de persiana. *Archivos Entomológicos*, **2**: 23-24.

Valcárcel, J.P. & Prieto Piloña, F. 2006. Aportaciones al conocimiento de los Pentatomoidea (Hemiptera) de Navarra (N de la Península Ibérica). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **39**: 381-387.

Valcárcel, J.P. & Prieto Piloña, F. 2009. Aportaciones al inventario de los Heteroptera (Hemiptera) de Galicia (N.O. Península Ibérica). I. Familia Coreidae Leach, 1815. *Archivos Entomológicos*, **1**: 3-15.

Valcárcel, J.P. & Prieto Piloña, F. 2014. Aportaciones al inventario de los Heteroptera (Hemiptera) de Galicia (NO Península Ibérica). III. Subfamilias Acanthosomatinae Signoret, 1864 (Acanthosomatidae) y Asopinae Amyot & Serville, 1843 (Pentatomidae). *Archivos Entomológicos*, **10**: 43-50.

Valcárcel, J.P., Prieto Piloña, F. & Roca-Cusachs, M. 2017. Aportaciones faunísticas a los Heteroptera de Andalucía (S de la Península Ibérica): Coreoidea, Pentatomoidea y Pyrrhocoroidea. *Revista gaditana de Entomología*, **8**(1): 249-263.

Vázquez, M.Á. & París, M. 1986. *Datos preliminares de Pentatomoidea y Coreoidea de las Lagunas de Ruidera (Hemiptera, Heteroptera)*, pp. 427-436. En: *Actas de las VIII Jornadas de la Asociación española de Entomología*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, [8] + 1280 pp.

Vázquez, M.Á., Costas, M., Novoa, F. & Baselga, A. 2003. Contribución al conocimiento de los heterópteros de las Islas Cíes (Galicia, noroeste de la Península Ibérica). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **27**(1-4): 149-155.

Vela, J.M. & Bastazo, G. 1986. Influencias biogeográficas en la fauna de heterópteros pentatomorfos de la Sierra de las Nieves (Málaga, España). *Actas de las VIII Jornadas de la Asociación española de Entomología*, Sevilla: 437-445.

Vidal, J.P. 1949. Hémiptères de l'Afrique du Nord et des pays circum-méditerranéens. *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc*, **48**: 1-238.

Vieira Lanero, R.; Lago, L.; Gómez-Sande, P.; Barca, S.; Servia, M.J.; Couto, M.T.; Nachón, D.J.; Morquecho, C.; Silva, S.; Cobo, M.C.; Otero, J.C.; Fernández, A.; González Philippon, R. & Cobo, F. 2015. *La biodiversidad en el lago de la mina de Meirama y su entorno*. USC-Estación de Hidrobiología "Encoro do Con". Ed. Gas Natural Fenosa. Madrid, 104 pp.

Viskens, G. & Bruers, J. 2009. III.1. Heteroptera - Wantsen uit Spanje. Deel II: Berytidae, Lygaeidae, Nabidae, Stenocephalidae, Coreidae, Alydidae, Rhopalidae, Scutelleridae, Acanthosomatidae en Pentatomidae. *Entomo-Info*, **20**: 45-53.

Wagner, E. 1954. *Geotomus petiti* nov. sp. eine neue Cydniden-Art aus Südfrankreich. *Vie et Milieu*, **4**(2) [1953]: 197-200.

Wagner, E. 1955. Contribution a la faune des Hémiptères-Hétéroptères de France. *Vie et Milieu*, **6**(2): 248-283.

Anexo 1. - Catálogo actualizado de las especies de Cydnidae, Pentatomidae (excepto Asopiniae), Scutelleridae y Thyreoconidae de Galicia por orden alfabético (citas bibliográficas, ○; citas nuevas, ●; ambos tipos de cita, ■).

	C	L	O	P
Familia CYDNIDAE Billberg, 1820				
Subfamilia Cydninae Billberg, 1820				
1. <i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771)	■	●	■	■
2. <i>Byrsinus flavicornis</i> (Fabricius, 1794)	●	●		○
3. <i>Geotomus elongatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	○	●	●	
4. <i>Geotomus petiti</i> Wagner, 1954				○
5. <i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)	■	●		■
6. <i>Macroscytus brunneus</i> (Fabricius, 1803)	○	●		
7. <i>Microporus nigrata</i> (Fabricius, 1794)				●
Subfamilia Sehirinae Amyot & Serville, 1843				
8. <i>Adomerus maculipes</i> (Mulsant & Rey, 1852)		●		●
9. <i>Canthophorus impressus</i> (Horváth, 1880)		○		
10. <i>Legnotus fumigatus</i> (A. Costa, 1853)		●		

	C	L	O	P
11. <i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)		●		
12. <i>Legnotus picipes</i> (Fallén, 1807)		●		●
13. <i>Ochetostethus nanus</i> (Herrich-Schaeffer, 1834)	■	○		■
14. <i>Ochetostethus pygmaeus</i> (Rambur, 1839)		●	●	●
15. <i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant & Rey, 1866	●			
16. <i>Sehirus morio</i> (Linnaeus, 1761)	○			
17. <i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	●	■
18. <i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1839)		●		
Familia PENTATOMIDAE Leach, 1815				
Subfamilia Pentatominae Leach, 1815				
19. <i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	○	●	●	●
20. <i>Aelia rostrata</i> Boheman, 1852			●	○
21. <i>Neottiglossa bifida</i> (A. Costa, 1847)		■	■	■
22. <i>Neottiglossa flavomarginata</i> (Lucas, 1849)				○
23. <i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schaeffer, 1830)		■	■	●
24. <i>Neottiglossa lineolata</i> (Mulsant & Rey, 1852)		●	●	○
25. <i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin, 1790)		●	●	○
26. <i>Holcogaster fibulata</i> (Germar, 1831)	■	●		○
27. <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	○	○	○	○
28. <i>Anthemina absinthii</i> (Wagner, 1952)				■
29. <i>Anthemina lunulata</i> (Goeze, 1778)				■
30. <i>Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum</i> (Rambur, 1839)				○
31. <i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1851)	■	■	■	■
32. <i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773)		■	●	●
33. <i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	■	■
34. <i>Holcostethus (Holcostethus) albipes</i> (Fabricius, 1781)				●
35. <i>Holcostethus (Holcostethus) sphacelatus</i> (Fabricius, 1794)				○
36. <i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	■	■	○	■
37. <i>Peribalus (Peribalus) strictus strictus</i> (Fabricius, 1803)	○	■	■	■
38. <i>Staria lunata</i> (Hahn, 1835)		●	●	
39. <i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	●	■		■
40. <i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)	○	●	■	■
41. <i>Eysarcoris venustissimus</i> (Schränk, 1776)		■	●	●
42. <i>Mecidea lindbergi</i> Wagner, 1954				○
43. <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	■	■
44. <i>Pentatoma (Pentatoma) rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	■	○
45. <i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	■	■	■	■
46. <i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	●	■	●	■
47. <i>Dyroderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775)	■	■	●	■

	C	L	O	P
48. <i>Menaccarus (Oploscelis) arenicola</i> (Scholtz, 1847)				■
49. <i>Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus</i> Fieber, 1851		●		
50. <i>Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis</i> Wollaston, 1858				●
51. <i>Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans</i> (Fabricius, 1794)	●	●	●	●
52. <i>Sciocoris (Sciocoris) galiberti</i> Ribaut, 1926		○		
53. <i>Sciocoris (Sciocoris) helferii</i> Fieber, 1851	○			
54. <i>Sciocoris (Sciocoris) sulcatus</i> Fieber, 1851		●		
55. <i>Eurydema (Eurydema) herbacea</i> (Herrich-Schaeffer, 1833)	■	■		■
56. <i>Eurydema (Eurydema) oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	●	●	●	■
57. <i>Eurydema (Eurydema) ornata</i> (Linnaeus, 1758)	○	■	●	■
58. <i>Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis</i> Kolenati, 1846		●	●	●
Subfamilia Podopinae Amyot & Serville, 1843				
59. <i>Ancyrosoma leucogrammes</i> (Gmelin, 1790)		■	■	
60. <i>Graphosoma (Graphosoma) lineatum</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	■	■
61. <i>Podops (Petalodera) dilatatus</i> Puton, 1873	■	●		○
62. <i>Podops (Podops) inunctus</i> (Fabricius, 1775)	○			○
Familia SCUTELLERIDAE Leach, 1815				
Subfamilia Eurygastrinae Amyot & Serville, 1843				
63. <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776)		■	○	○
64. <i>Eurygaster hottentotta</i> (Fabricius, 1775)			○	○
65. <i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	●	■
66. <i>Eurygaster testudinaria testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	●	●	■	■
67. <i>Psacasta (Cryptodontus) tuberculata</i> (Fabricius, 1781)				○
68. <i>Psacasta (Psacasta) exanthematica exanthematica</i> (Scopoli, 1763)		●	○	●
69. <i>Psacasta (Psacasta) granulata</i> (A. Costa, 1847)		●		
Subfamilia Odontoscelinae Amyot & Serville, 1843				
70. <i>Odontoscelis (Odontoscelis) dorsalis</i> (Fabricius, 1798)	○			○
71. <i>Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa</i> (Linnaeus, 1761)				○
72. <i>Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica</i> Göllner-Scheiding, 1987				●
73. <i>Odontoscelis (Odontoscelis) lineola</i> Rambur, 1839	●		●	●
Subfamilia Odontotarsinae Mulsant & Rey, 1865				
74. <i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (Rossi, 1790)			●	
Familia THYREOCORIDAE Amyot & Serville, 1843				
Subfamilia Thyreocorinae Amyot & Serville, 1843				
75. <i>Thyreocoris fulvipennis</i> (Dallas, 1851)				○

Anexo 2. - Relación de las nuevas localidades citadas en el texto con sus correspondientes coordenadas U.T.M. 10x10.

Provincia de A Coruña			
A Coruña (casco urbano)	29TNJ40	O Burgo	29TNJ40
Aranga	29TNH88	Parque do Casino (A Zapateira)	29TNH49
Ardaña (Carballo)	29TNH28	Parque Martí (Santa Cristina, Perillo)	29TNH59
As Xubias de Arriba	29TNH49	Piadela (Encoro de Cecebre)	29TNH69
Baio	29TNH07	Pontealbar	29TNH35
Baldaio	29TNH29	Portomouros	29TNH25
Barrio de San Lázaro (Santiago de Compostela)	29TNH34	Praia da Magdalena (Cabanas)	29TNJ60
Bembibre (Val do Dubra)	29TNH26	Praia de Area Maior (Louro)	29TMH93
Betanzos	29TNH69	Praia de Baldaio	29TNH29
Castro de Elviña	29TNH49	Praia de Barrañán	29TNH39
Cecebre	29TNH59	Praia de Carnota	29TMH94
Cee	29TMH85	Praia de Corrubedo	29TMH91
Central de Zarzo (río Mandeo)	29TNH79	Praia de Langosteira (Fisterra)	29TMH75
Couto de Chelo	29TNH69	Praia de Morouzos (Ortigueira)	29TNJ93
Finca Romarís (Bastabales, Brión)	29TNH24	Praia de Ponteceso	29TNH09
Lagoa de Louro	29TMH93	Praia de Vilarrube	29TNJ73
Lagoa de Muro (Xuño)	29TMH91	Rego do Castro (A Zapateira)	29TNH49
Lariño	29TMH93	San Pedro de Leixa (Ferrol)	29TNJ61
Laxe	29TMH98	Santa Cristina	29TNH59
Louro	29TMH93	Santiago de Compostela	29TNH34
Macenda (Encoro de Cecebre)	29TNH59	Silvosa (Muros)	29TNH04
Meicende	29TNH49	Traba (Laxe)	29TMH98
Monte Cedeira (Cerceda)	29TNH37	Valdoviño	29TNJ62
Monte Cova da Serpe	29TNH87	Vite (Santiago de Compostela)	29TNH34
Monte Xalo	29TNH48		
Provincia de Lugo			
A Bastida (Monforte de Lemos)	29TPH10	Fisteus (Serra do Courel)	29TPH40
A Cortevella (Serra do Miradoiro)	29TPH47	Fonte de Carbedo (Folgozo do Courel)	29TPH52
A Fonsagrada	29TPH57	Formigueiros (Serra do Courel)	29TPH51
A Ponte do Campal, río da Veiga (Monforte de Lemos)	29TPH21	Fraga de Carballido (A Fonsagrada)	29TPH19
A Seara (Alfoz)	29TPJ22	Fraga de Seixosmil (Serra de Meira)	29TPH48
A Vacariza (Monforte de Lemos)	29TPH10	Freixo (Serra do Ouribio)	29TPH33
Alence (Serra do Rañadoiro)	29TPH52	Froxán (Serra do Courel)	29TPH41
Alto do Aldriz (Quiroga)	29TPH30	Graveiras de Cadórniga (Monforte Lemos)	29TPH10
Alto de Pedras Apañadas (A Fonsagrada)	29TPH67	Guitiriz (casco urbano)	29TNH88
Alto de San Roque (O Cebreiro)	29TPH52	Liber, Becerreá	29TPH54
Alto do Couto (Serra do Courel)	29TPH51	Lugo	29TPH16
Alto do Poio (Serra do Rañadoiro)	29TPH53	Lugo (Campus Universitario)	29TPH16
Arexo (A Fonsagrada)	29TPH67	Lugo (casco urbano)	29TPH16
As Lamas (Monforte de Lemos)	29TPH21	Monforte de Lemos	29TPH20
Babela (Monforte de Lemos)	29TPH10	Monforte de Lemos (casco urbano)	29TPH20
Baralla	29TPH45	Monforte de Lemos (Parque dos Condes)	29TPH20
Barcia (Navia de Suarna)	29TPH65	Monte Pradairo (Serra do Miradoiro)	29TPH37
Bascuas (Parga)	29TNH98	Montefurado	29TPG49
Becerreá	29TPH54	Monterroso	29TNH93
Begonte	29TPH07	Moreda (Monforte de Lemos)	29TPH11
Bóveda	29TPH22	Navia de Suarna	29TPH65
Castroverde	29TPH36	O Ceao	29TPH16
Chao do Fabeiro (Monforte de Lemos)	29TPH21	O Mato (Chao do Fabeiro)	29TPH11
Cortes (Serra do Courel)	29TPH41	O Rial (Serra do Miradoiro)	29TPH47
Degrada (Serra dos Ancares)	29TPH64	O Saviñao	29TPH12
Distriz	29TPH10	Os Picouzos (Monforte de Lemos)	29TPH21
Doiras (Serra dos Ancares)	29TPH54	Outeiriño (Monforte de Lemos)	29TPH21
Encoro de Vilasouto	29TPH22	Parada dos Montes	29TPH41
Escádebas (Guitiriz)	29TNH98	Parque dos Lagos de Teixeira	29TPH26
Ferrería de Incio	29TPH32	Pedreda	29TPH26

Pena do Pico (Becerreá)	29TPH44	San Xoán de Chavaga (Monforte de Lemos)	29TPH21
Pico do Forno de Martín (Serra de Meira)	29TPH48	Santa Comba (río Chamoso)	29TPH25
Piñeira (Monforte de Lemos)	29TPH20	Sarria	29TPH23
Piño (Monforte de Lemos)	29TPH21	Seceda (Serra do Courel)	29TPH42
Piornedo (Serra dos Ancares)	29TPH74	Seoane (Monforte de Lemos)	29TPH11
Praia de Esteiro (O Barqueiro)	29TPJ04	Seoane do Courel	29TPH40
Portomarín (casco urbano)	29TPH14	Serra da Vacariza	29TPH46
Puntín (Quiroga)	29TPH40	Serrón da Pedra da Hedra	29TPH54
Reboredo (Vilalba)	29TPH08	Viladicente (Serrón da Pena da Hedra)	29TPH54
Ribasaltas (Monforte de Lemos)	29TPH21	Vilaescura (Sober)	29TPH10
Rubián	29TPH22	Vilarello (Serra dos Ancares)	29TPH74
Sabarei	29TPH25	Xullán (Bóveda)	29TPH22
Samos	29TPH42	Zanfoga	29TPH62
Provincia de Ourense			
A Rúa	29TPG59	Parada de Ribeira (Xinzo de Limia)	29TPG05
A Veiga de Cascallá	29TPH70	Pena Trevinca	29TPG88
Alto de Penagache (Quintela de Leirado)	29TNG76	Portela do Trigal	29TPG79
Alto do Vieiro (Bande)	29TNG85	Pozo do Lago (Maside)	29TNG79
Balneario de Requeixo (Verín)	29TPG24	Santo Estevo de Ribas de Miño	29TPH01
Cabeza Grande de Manzaneda	29TPG48	Santa Ana (A Limia)	29TPG06
Casaio	29TPG89	Sas de Penelas	29TPG39
Encoro de San Martiño	29TPG59	Serra do Invernadoiro	29TPG36
Fonte da Cova (Pena Trevinca)	29TPG88	Valborrás (Carballeda de Valdeorras)	29TPG88
Laza	29TPG25	Valencia do Sil	29TPG59
Montecelo (Serra do Larouco)	29TPG04	Verín	29TPG24
O Barco de Valdeorras	29TPH60	Viladequinta (Carballeda de Valdeorras)	29TPG79
Os Peares	29TPH00	Vilar de Silva	29TPG79
Oulego	29TPH60	Vilariño (O Barco de Valdeorras)	29TPG69
Ourense (casco urbano)	29TNG98		
Provincia de Pontevedra			
A Ramallosa	29TNG16	O Grove	29TNH10
A Serpe (Poio)	29TNG29	O Santo (Sanxenxo)	29TNG19
As Eiras	29TNG14	Paredes (A Caniza)	29TNG67
Aciveiro	29TNH51	Pontearreas	29TNG46
Agolada	29TNH83	Pontecaldelas	29TNG49
Ardia (O Grove)	29TNH10	Portonovo (Parque do Espiñeiro)	29TNG19
Cabral (Vigo)	29TNG27	Praia da Lanzada (O Grove)	29TNG19
Cabo Home	29TNG17	Praia de Areagrande, O Grove	29TNH00
Caldas de Reis	29TNH21	Praia de Areas (Sanxenxo)	29TNG19
Carboeiro	29TNH63	Praia de Baltar (Portonovo)	29TNG19
Carregal (Tomiño)	29TNG24	Praia de Barra	29TNG17
Cuntumil (Sanxenxo)	29TNG19	Praia de Camposancos	29TNG13
Donón (Cangas do Morrazo)	29TNG18	Praia de Pragueira (Sanxenxo)	29TNG19
Dorrón (Sanxenxo)	29TNG19	Rial (Portonovo)	29TNG19
Fragoselo (Vigo)	29TNG17	San Vicente do Grove	29TNH00
Illa de Arousa	29TNH11	Sanxenxo	29TNG19
Mondariz-Balneario	29TNG47	Simes (Meaño)	29TNG19
Moreira (Pontearreas)	29TNG46	Vichocuntín (Cerdedo-Cotobade)	29TNH40
Nanín (Sanxenxo)	29TNG19	Vigo	29TNG27
Nantes (Sanxenxo)	29TNG19		