

Primer registro de *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804) (Col., Meloidae) para Castilla y León (España)

Honorio Iglesias¹ & Enrique Fernández Larreta²

¹ c/ Peña del Hombre, 17. E-40422 Otero de Herreros (Segovia, ESPAÑA). e-mail: honorio_iglesias@yahoo.es

² c/ Real, 16. E-34810 Aguilar de Campoo (Palencia, ESPAÑA). e-mail: elarreta@gmail.com
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0006-1558-1049>

Resumen: Se cita por primera vez a *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804) (Col., Meloidae) en Castilla y León (España), a partir de un ejemplar observado y fotografiado en julio de 2026 en la localidad de Otero de Herreros (Segovia).

Palabras clave: Coleoptera, Meloidae, Nemognathinae, Nemognathini, *Stenoria apicalis*, corología, distribución, Segovia, España, península ibérica.

Abstract: First record of *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804) (Col., Meloidae) from Castilla y León (Spain). *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804) (Col., Meloidae) is recorded for the first time from Castilla y León (Spain), on the basis of a specimen observed and photographed in July 2026 in the locality of Otero de Herreros (Segovia).

Key words: Coleoptera, Meloidae, Nemognathinae, Nemognathini, *Stenoria apicalis*, chorology, distribution, Segovia, Spain, Iberian Peninsula.

Recibido: 21 de julio de 2026

Publicado on-line: 25 de septiembre de 2026

Aceptado: 27 de julio de 2026

El meloideo *Stenoria apicalis* (Latreille, 1802) (Col., Meloidae) es una especie ampliamente repartida (García-París *et al.*, 2006), con una distribución sudeuropea-turánica-magrebí (Bologna, 1991). Es considerada rara y esporádica en Italia (Bologna, 1991) y otro tanto podría decirse de su estatus en España, particularmente en las áreas del interior, donde cuenta con escasos registros pues, como mencionan Pérez-Moreno *et al.* (2003), el grueso de las citas ibéricas se concentra en una franja del levante peninsular paralela a la línea costera mediterránea.

Autores como García-París (2000), Ruiz (2001), Pérez-Moreno *et al.* (2003), Viñolas *et al.* (2012) o Prieto *et al.* (2016) han recopilado las citas existentes en la bibliografía, revisado el material de procedencia española albergado en diversas colecciones y aportado nuevos registros para la especie. Exceptuando las citas referidas por Prieto *et al.* (2016) de ejemplares de diversas localidades barcelonesas colectados por J.M. Diéguez entre los años 2006 y 2012, todos los demás especímenes datados que constan en la bibliografía revisada fueron capturados hace ya más de 20 años.

En la zona centro de España, área en la que se localiza la observación descrita en esta nota, sólo existían hasta el momento dos registros de la especie, correspondientes, respectivamente, a las localidades de Cercedilla y El Escorial, en la provincia de Madrid (Pardo Alcaide, 1958; García París, 2000). El ejemplar de Cercedilla, sin fecha de captura, lo menciona Pardo Alcaide (1958) en la séptima entrega de sus anales entomológicas, dedicada a los Sitarini (actualmente Nemognathini), aportando el dato de que fue capturado por el Dr. Farriols. Sin duda, Pardo Alcaide se refiere a Josep María Farriols i Centena (1886-1954), médico ginecólogo de profesión y entomólogo por afición. Según García-París (2000), el ejemplar de El Escorial, también sin datar, fue colectado por el entomólogo Francisco de Paula Martínez y Sáez (1835-1908). Es fácil concluir, por tanto, que no ha habido ni un sólo registro de *S. apicalis* en la región central de la península ibérica durante, al menos, los últimos 72 años.



Fig. 1.- Entorno en el que se localizó el ejemplar estudiado de *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804), en Otero de Herreros (Segovia), julio de 2026.





Fig. 2.- *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804), en Otero de Herreros (Segovia), julio de 2026. 2a.- Vista dorsal. 2b.- Vista frontal.

El pasado cinco de julio de 2026, el primero de los autores observó y fotografió un ejemplar de *S. apicalis* en la localidad de Otero de Herreros, provincia de Segovia, Castilla y León, España, MGRS 30TUL91 (Mapa 1). El individuo se encontró en un área de encinar abierto, con orla arbustiva espinosa, matorral disperso y quejigo refugiado en el fondo de valle, donde llega a ser predominante (Fig. 1). Fue hallado sobre una mata de *Eryngium campestre* L., dato concordante con la neta preferencia de la especie por las apiáceas de este género documentada por Bologna (1991).

Aunque el ejemplar no fue capturado, las fotografías realizadas permiten asegurar que se trata, sin ninguna duda, de *S. apicalis*. El pronoto, sin relieves apreciables y de color amarillo (Fig. 2a), lo diferencia claramente de *Stenoria analis* Schaum, 1859, especie en la que es siempre de color negro y con unos relieves muy marcados. En visión frontal (Fig. 2b), la cabeza, con sienes bastante prominentes, permite descartar igualmente a *Stenoria antoinei* Pardo Alcaide, 1953, que en la península ibérica únicamente ha sido citado de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Ruiz, 2001). Las antenas, extendidas hacia atrás, alcanzarían aproximadamente el tercio anterior de los élitros, lo que evidencia que se trata de una hembra (Bologna, 1991; Ruiz, 2001).



Mapa 1. - Mapa U.T.M. 10x10 km con la distribución conocida de *Stenoria apicalis* (Latreille, 1804) en España. Registros bibliográficos, provincias sombreadas; nuevo registro (Otero de Herreros, Segovia), círculo negro [●].

La posible importancia de esta observación de *S. apicalis* radica en que se trata del primer registro de esta especie para Castilla y León (España) y también del primero tras un largo paréntesis sin tener noticias de su presencia en el área central de la península ibérica.

Agradecimientos

Pablo Bahillo de la Puebla, Mercedes París, Alberto Sánchez Vialas, Pedro Oromí Masoliver y Alberto González Rodríguez aportaron diversos datos y sugerencias que resultaron de gran valor para la elaboración de esta nota. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por la ayuda prestada y por su amabilidad y gentileza.

Bibliografía

- BOLOGNA, M.A. 1991. *Fauna d'Italia. Vol. XXVIII. Coleoptera Meloidae*. Edizioni Calderini. Bologna. 541 pp.
- GARCÍA-PARÍS, M. 2000. Nuevas localidades de Sitarini (Coleptera: Meloidae) en la Península Ibérica. *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **24**(3-4): 197-200.
- GARCÍA-PARÍS, M., TROTTA-MOREU, N. & CAPOTE, L. 2006. Estado de conocimiento actual y problemas de conservación de los Meloidae (Coleoptera) de la Comunidad de Madrid. *Graellsia*, **62** (número extraordinario): 333-370.
- PARDÓ ALCAIDE, A. 1958. *Analectas entomológicas VII. Los Sitarini de la Península Ibérica (Col. Meloidae)*. *Graellsia*, **16**: 13-22.
- PÉREZ-MORENO, I., SAN MARTÍN, A.F. & RECALDE IRURZUN, J.I. 2003. Aportaciones corológicas y faunísticas sobre meloidos ibéricos (Coleoptera: Meloidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **33**: 195-217.

PRIETO, M., GARCÍA-PARÍS, M. & MASÓ, G. 2016. La colección iberoblear de Meloidae Gyllenhal, 1810 (Coleoptera, Tenebrionoidea) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. *Arxius de Miscel·lània Zoològica*, **14**: 117-216.

RUIZ, J.L. 2001. Las *Stenoria* Mulsant, 1857 del grupo de *S. apicalis* (Latreille, 1802) de la Península Ibérica (Coleoptera, Meloidae). *Graellsia*, **57**(2): 161-173.

VIÑOLAS, A., SOLER, J. & MUÑOZ, J. 2012. Nuevos registros y nuevas localizaciones de coleópteros para la Península Ibérica y en especial del Paratge Natural de l'Albera, Girona (Coleoptera). *Elytron*, **25**: 3-63.