

NOTAS BREVES / SHORT NOTES

***Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Pyrochroidae) en el Geoparque de Cabo Ortegal (Galicia, NW de la Península Ibérica): nuevos datos sobre su biología.**

En la mayoría de los estudios sobre *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) los autores asocian su presencia con especies frondosas, donde se desarrolla de manera subcortical en la madera muerta y húmeda (ESPAÑOL, 1968; VÁZQUEZ, 1993; TORRELLA & ARZÚA, 2011; DE LA ROSA MALDONADO, 2014) y obtiene su alimento, basado en hongos y larvas de otras especies saproxílicas (PŘIKRYL *et al.*, 2012).

Al igual que en el resto del territorio peninsular, los registros de *P. coccinea* en Galicia son relativamente escasos y reflejan una distribución bastante localizada (DEVESA *et al.*, 1995; SÁNCHEZ RUIZ & LÓPEZ COLÓN, 1998; PÉREZ VALCÁRCEL & PRIETO PILOÑA, 2009; AYRES & BAO, 2016). Si bien existían citas previas del taxón en estadios larvales y pupales bajo la corteza de ejemplares de *Eucalyptus* abatidos en bosque mixto (TORRELLA & ARZÚA, 2011), algo que constituyó una novedad biológica al vincularse a un fitohuésped atípico y no caducifolio, mediante la presente nota nos proponemos difundir otra observación singular de la especie con el objeto de dar a conocer novedades sobre su ecología y biología.

Material estudiado: A Coruña: 24-V-2026. Chao do Monte, Serra da Capelada, Cedeira (Geoparque de Cabo Ortegal). Altitud: 358 m s.n.m. UTM 10x10 km: 29TNJ83. 2 ej. (Fig. 1). Torrella & Pego det.

El área de estudio se sitúa en la cabecera del valle de Teixidelo. Se trata de un entorno con abundante presencia de ganado vacuno y equino en libertad (Fig. 2), con suelos básicos poco profundos y una escasa cobertura arbórea. Está dominado por matorral bajo de *Ulex* sp. y *Erica* sp., así como por diversas plantas herbáceas adaptadas a las particulares condiciones químicas del sustrato. En esta zona se localizan también pequeñas masas de



Fig. 1.- Ejemplar de *Pyrochroa coccinea* en la Serra da Capelada (Cedeira, A Coruña).

repoblación de *Pinus radiata* y *Pinus pinaster*, entre las que se encontraban varios pinos de mediano porte recientemente talados, cuya madera permanecía apilada en montones dispersos. Los troncos de mayor diámetro, correspondientes a la sección basal, presentaban afección fúngica, cierto grado de podredumbre y galerías de coleópteros saproxilófagos de diversos tamaños.

Este hallazgo, además de contribuir al conocimiento de los requerimientos ecológicos y biológicos de *P. coccinea* por tratarse de formaciones de coníferas, amplía su distribución conocida a una nueva cuadrícula UTM de 10x10 km, y sugiere una notable capacidad de dispersión o, potencialmente, una gran amplitud de nicho, lo que respalda el carácter oportunista de la especie planteado de manera previa en otros trabajos (PŘIKRYL & HORÁK, 2009).



Fig. 2.- Hábitat donde se han localizado los ejemplares de *Pyrochroa coccinea*.

Bibliografía. AYRES, C. & BAO, V. 2016. Primeiros rexistros de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761), familia Pyrochroidae en Pontevedra (Noroeste da Península Ibérica). *Braña*, **14**: 25-26. • DE LA ROSA MALDONADO, J.J. 2014. *Coleópteros Saproxílicos de los Bosques de Montaña en el Norte de la Comunidad de Madrid*. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. 300 pp. •

DEVESA, S., VALCÁRCEL, J.P., MEJUTO, C. & CERVIÑO, G. 1995. Presencia en Galicia (N.O. Península Ibérica) de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) y *Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Pyrochroidae). *Zapateri, Revista aragonesa de entomología*, **5**: 177-178. • ESPAÑOL, F. 1968. Entomofauna forestal española: La familia Pyrochroidae (Col. Heteromera). *Boletín del Servicio de Plagas Forestales*, **11**(22): 111-113. • PÉREZ VALCÁRCEL, J. & PRIETO PILOÑA, F. 2009. Nuevos registros de pirocroidos (Coleoptera, Pyrochroidae) para Galicia (N.O. Península Ibérica). *Arquivos Entomolóxicos*, **2**: 22. • PŘIKRYL, Z. & HORÁK, J. 2009. A trip to microcosm of saproxylic beetles' larvae guts, p. 336. In: FIKÁČEK, M., SKUHROVEC, J. & ŠÍPEK, P. (eds.). Abstracts of the Immature Beetles Meeting 2009. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, **50**(1) 2010: 321-340. • PŘIKRYL, Z.B., TURČÁNI, M. & HORÁK, J. 2012. Sharing the same space: foraging behaviour of saproxylic beetles in relation to dietary components of morphologically similar larvae. *Ecological Entomology*, **37**: 117-123. • SÁNCHEZ RUIZ, A. & LÓPEZ COLÓN, J.I. 1998. Nota de caza (Coleoptera: Pyrochroidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **22**: 28. • TORRELLA, P. & ARZÚA, M. 2011. Nuevos datos sobre la biología y distribución de *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Pyrochroidae) en Galicia (NW de la Península Ibérica). *Arquivos Entomolóxicos*, **5**: 63-66. • VÁZQUEZ, X.A. 1993. *Coleoptera: Oedemeridae, Pyrochroidae, Pythidae, Mycteridae*. En: Ramos, M.A. et al. (eds.). *Fauna Ibérica*, vol. 5. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid, 181 pp.

Pablo Torrella. Museo de Historia Natural (SGHN). Praza de Canido, s/n. E-15401 Ferrol (A Coruña).
e-mail: pablo.museo@sghn.org

Marta Pego. Museo de Historia Natural (SGHN). Praza de Canido, s/n. E-15401 Ferrol (A Coruña).
e-mail: pegoninomarta@gmail.com

Recibido: 13 de junio de 2026 | Aceptado: 21 de junio de 2026 | Publicado on-line: 26 de julio de 2026

NOTAS BREVES / SHORT NOTES

Nuevo registro de *Ventocoris falcatus* (Cyrillus, 1791) (Heteroptera: Pentatomidae) para Castilla-La Mancha (España).


Ventocoris falcatus (Cyrillus, 1791) (Heteroptera: Pentatomidae) es un pentatómido de distribución mediterránea occidental (Péricart, 2010). En la Península Ibérica su distribución está por establecer, con escasas citas dispersas en casi todo su territorio, aunque haciéndose más raras hacia el oeste y al

parecer faltando en el extremo noroccidental y en Portugal (Péricart, 2010; Roca-Cusachs & Goula, 2017). En la Comunidad de Castilla-La Mancha sólo se ha citado con anterioridad, hasta donde hemos podido revisar, de Ciudad Real (Vázquez & París, 1986) y Toledo (Roca-Cusachs & Goula, 2017), siendo la cita que presentamos la primera para la provincia de Albacete. Con respecto a la ecología de esta especie, ni su hábitat ni sus plantas nutricias se conocen con exactitud, asociándose según Péricart (2010) a diversas brasicáceas.

Material estudiado: Albacete: Hoces del Batanejo, Villalgordo del Júcar, 9/07/2025, 1♀, A. Perucho leg. (actualmente depositado en la col. J.P. Valcárcel) (Fig. 1). El ejemplar se capturó entre hierbas (junto con otros ejemplares no recogidos) al borde de un camino que bordea un bosque de pino piñonero y encinas predominantemente, con sotobosque de matorrales xerófilos (Fig. 2).

Agradecimientos: A Fernando Prieto Piloña, por su inestimable colaboración en distintos aspectos de este trabajo.

Bibliografía: Vázquez, M.A. & París, M. 1986. Datos preliminares de Pentatomoidea y Coreoidea de las Lagunas de Ruidera (Hemiptera, Heteroptera), pp. 427-436. En: Actas de las VIII Jornadas de la Asociación española de Entomología. Servicio Publicaciones Universidad de Sevilla. Sevilla: [8] + 1280 pp. ● Péricart, J. 2010. Hémiptères Pentatomoidea Euro-Méditerranéens. Volume 3: Podopinae et Asopinae. Faune de France, 93. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles. Paris, 290 pp. ● Roca-Cusachs, M. & Goula, M. 2017. Photosharing website photographs as a tool to refine distribution of Iberian and Canarian Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 60: 397-405.



Figs. 1-2.- *Ventocoris falcatus* (Cyrillus, 1791), ejemplar ♀ de Villalgordo del Júcar (Albacete).

Javier Pérez Valcárcel. e-mail: arquivosentomologicos@gmail.com

Antonio Perucho. e-mail: peruchoantonio12@gmail.com

Recibido: 23 de junio de 2026 | Aceptado: 26 de junio de 2026 | Publicado on-line: 26 de julio de 2026

NOTAS BREVES / SHORT NOTES